

Njega zaštite bilja u srpnju u vinogradima

Автор(и): гл.експерт Татяна Величкова, Дирекция "Оценка на риска по хранителната верига", ЦОРХВ

Дата: 06.07.2017 Број: 7/2017



Tijekom ovog razdoblja, vinova loza se nalazi u fenološkoj fazi od "kraja cvatnje" do "početka zrenja bobica" kod ranih sorti.

Glavni štetnici za ovo razdoblje

Plamenjača vinove loze *Plasmopara viticola*

Prašina *Oidium tuckeri*

Siva plijesan *Botrytis cinerea*

Бактеријски рак *Agrobacterium vitis*

Grozdova zavijača *Lobesia botrana*

Loza moljac *Theresimima ampellophaga*

Loza štitasta uš *Pulvinaria vitis*

Žuti grinja vinove loze *Schizotetranychus viticola*

Bakterijski rak

Kod zaraženih biljaka na odrvenjelim dijelovima, blizu površine tla ili neposredno ispod nje, uočavaju se izrasline (tumori). Oboljele biljke pokazuju usporen rast, klorotično lišće i lako se ozlijede zimi tijekom hladne zime.

Strategija suzbijanja štetnika:

U srpnju je potrebno označiti trsove koji pokazuju simptome bolesti.

Loza štitasta uš

Izleganje ličinki nastavlja se tijekom prve polovice srpnja. Štetu nanose sisanjem biljnih sokova iz listova, izbojaka i grozdova. Presvlače se jednom, hrane se određeno vrijeme, zatim napuštaju mjesta hranjenja i odlaze na mjesta prezimljavanja. Kao posljedica štete, vinova loza slabi.

Strategija suzbijanja štetnika:

Kemijsko suzbijanje provodi se protiv mladih ličinki.

Odobreno sredstvo za zaštitu bilja:

movento 100 sc - 0,075-0,095%;

