

Tjedni agrometeorološki prognoza za kraj srpnja i početak kolovoza

Автор(и): Растителна защита
Дата: 29.07.2017 Брой: 7/2017



Krajem srpnja i tijekom prvih dana kolovoza, razvoj poljoprivrednih kultura odvijat će se pri temperaturama blizu klimatskih normi, a u mnogim dijelovima zemlje – s poboljšanim zalihami vlage u tlu.

Nakon oluja, tuče i obilnih kiša (Ruse - 45 l/m², Silistra - 43 l/m² i Shumen - 33 l/m²) koje su pale tijekom posljednjih dana proteklog razdoblja, u sljedećem razdoblju očekuje se stabilizacija vremena i promjena agrometeoroloških uvjeta. Tuča koja je pala na mnogim mjestima u sjevernoj Bugarskoj (Vratsa, Polski Trambesh, Troyan, Ruse, Tsarev Brod) ponovno nije poštedjela poljoprivredne kulture. Nanesena je šteta dijelu nepožnjevenih nasada pšenice (leglo usjeva, otpadanje klasova), kao i jarnim usjevima, povrtnim kulturama i voćnim drvećem.

Početkom sljedećeg razdoblja, pri prvoj prilici, povrtne kulture, voćno drveće i vinova loza pogođeni tučom poželjno je tretirati fungicidima koji sadrže bakar kako bi se ubrzalo zacjeljivanje rana i smanjile sekundarne infekcije patogenima (siva plijesan na vinovoj lozi, kasna smeđa trulež na plodovima voćaka, kasna plamenjača krumpira i alternarioza na rajčicama).

Krajem srpnja i tijekom prvih dana kolovoza, razvoj poljoprivrednih kultura odvijat će se pri temperaturama blizu klimatskih normi, a u mnogim dijelovima zemlje – s poboljšanim zalihama vlage u tlu. Tijekom razdoblja, kod ranijih hibrida kukuruza, promatrat će se stadij mliječne zrelosti i prijelaz iz mliječne u voštanu zrelost u nasadima na pojedinim mjestima u Podunavskoj nizini i u južnim regijama zemlje. Kod suncokreta, odvijat će se punjenje sjemena. Početkom kolovoza, dio nasada u južnoj Bugarskoj ući će u početak stadija zrenja.

Tijekom razdoblja, povećani sadržaj vlage u gornjim slojevima tla na pojedinim mjestima će odgoditi završetak žetve pšenice.

Izvor: NIMH-BAS