

Agrometeorológiai előrejelzés 2019 márciusára

Автор(и): Растителна защита
Дата: 18.03.2019 Брой: 3/2019



Március elején az évszakhoz képest meleg időjárás fogja meghatározni az agrometeorológiai viszonyokat. Az első tíz napban az ország szántóföldi régióinak nagy részében a napi középhőmérséklet előrejelzett értékei meghaladják a téli gabonafélék és a repce növekedési folyamatainak újraindulásához szükséges biológiai minimumot.

A második tíz nap elején hőmérséklet-csökkenés várható, amely Észak-Bulgáriában és a magasabb mezőkön jelentősebb lesz, és ez korlátozni és késleltetni fogja a mezőgazdasági növények fejlődését. Ebben a tíz napban főként az ország legdélebbi és legkeletibb régióiban alakulnak ki kedvező feltételek a lassú növekedéshez a téli gabonafélékben.

Március második tíz napjának végén és a harmadik tíz napjának elején hőmérsékleti viszonyok javulása és a növekedési folyamatok aktiválódása várható az őszi vetésű növényekben és a többéves ültetvényekben.

Március végére a későn fejlődő, 2–3 levél stádiumban áttelelt búza- és árpaállományok nagy része a szárhasadás stádiumába lép. Az őszi szárhasadt téli gabonafélékben a szárhasadási tényező növekedése figyelhető meg. Március végére a rozettas stádiumban áttelelt repce ágakat fog képezni.

Márciusban a gyümölcstermő növényekben a rügyduzzadás és a rügpattanás fázisai zajlanak le.

A hónap végén a korai virágzású fajoknál (mandula, kajszibarack, őszibarack) a virágrügy-stádium figyelhető meg, és egyes helyeken, főként a déli régiókban, a virágzás kezdete is. A hónap során a előrejelzett, akár mínusz 8°C-ig terjedő minimumhőmérsékletek kockázatot jelentenek a legfejlettebb, a rügyképződés és virágzás stádiumába lépett gyümölcsfákra. A márciusra várható, a normálérték körüli csapadék növelni fogja a talaj nedvességtartalékát az egy méteres és mélyebb talajrétegekben. Február végén a szántóföldi régiók nagy részében a téli gabonafélék egy méteres talajrétegében a nedvességtartalék meghaladta a teljes víztartó képesség (TVK) 90%-át. Kivételek voltak a Duna-síkság egyes helyein (Novacene agrometeorológiai állomás), a legdélebbi (Haszkovo) és keleti régiókban (D. Chiflik), ahol a nedvességtartalék szintje alacsonyabb – a TVK 85–86%-a volt. A hónap során a korai és középkorai tavaszi növények vetésére szánt területek előveti művelésére, valamint a gyümölcsösök növényvédő permetezésére kedvezőbb feltételek a hónap elején, a második tíz nap második felében és a harmadik tíz nap közepén alakulnak ki. Március közepén kezdődik a napraforgó vetés agrotechnikai időablaka (15–20.03) Dél-Bulgáriában, a harmadik tíz nap közepén (25.03–5.04) pedig a Duna-síkságon.

Forrás: NIMH