

Szőlő növényvédelmi gondozása

Автор(и): Растителна защита
Дата: 30.03.2019 Брой: 3/2019



Fő kártevők márciusra és áprilisra

Szőlő excoriosis *Phomopsis viticola*

Gyümölcsfa vörösatka *Panonychus ulmi*

Szőlőmoly *Lobesia botrana*

Szőlő excoriosis

A betegség kórokozója termőtestek formájában telel át az érett hajtások kérgében, valamint micéliumként a rügyekben és a fásszövetben. A betegség kialakulásának kritikus időszaka a szőlő "rügyduzzadás" fejlődési stádiumától a "3–4. levél" stádiumáig tart, mérsékelt meleg időjárás és 98–100% feletti levegő páratartalom mellett. A betegség tünetei az elsődleges rügyek elhalásában, a karok elnyúlásában és visszahalásában nyilvánulnak meg.

Kártevőirtási stratégia

Növényvédő szerek kezelése kötelező, ha a betegséget az előző évben észlelték a szőlőültetvényekben. Egyetlen önálló permetezést akkor végeznek, amikor a hajtások tövében található rügyek kb. 40%-a a "zöld csúcs" fejlődési stádiumban van. Hűvös és esős tavasz esetén, amikor az excoriosis érzékeny időszaka meghosszabbodik, egy második permetezést akkor hajtanak végre, amikor a hajtások tövében található rügyek 30–40%-a a "2–3 levél" fejlődési stádiumban van.

Engedélyezett növényvédő szerek

Verita WG - 0,2%; Mikal Flash - 0,3%; Momentum Extra WG - 300 g/ha; Pencozeb 75 WG - 210 g/ha; Solofol - 188 g/ha; Thiovit Jet 80 WG - 1250 g/ha; Folder 80 WG - 187,5 g/ha; Follow 80 WG / Friller 80 WG / Flowet 80 WG - 187,5 g/ha; Delan 700 WDG - 0,2%; Kumulus DF - 750 g/ha.

Gyümölcsfa vörösatka

A lárvák, nimfák és felnőtt atkák a fejlődő rügyekből és a levelek fonákjából nedveket és klorofillszemcséket szívva okoznak kárt. Enzimeket választanak ki, amelyek lebontják a levelek pigmentjeit. A károsítás eredményeként a levéllemez színe enyhén megváltozik. Távolról a levelek szürkésbarnának tűnnek, és szélük felfelé göngyölgdik.

Kártevőirtási stratégia

A permetezést a "rügyduzzadás" fejlődési stádiumig és a peték kelésének kezdetén végzik.

Engedélyezett növényvédő szerek

Para Sommer - 3%; Zoom 11SC - 12,55 ml/ha; Ovipron TOP EC – 2500–3500 ml/ha; Thiovit Jet 80 WG - 2000 g/ha.

Szőlőmoly

Az áttelelt nemzedék lepkéinek rajzása akkor kezdődik, amikor a napi átlaghőmérséklet kb. tíz napos időszak alatt 10–12 °C fölé emelkedik.

Kártevőirtási stratégia

Márciusban és áprilisban a kártevő első nemzedékének lepkéinek rajzásának és vonzott példányainak számának nyomon követésére feromoncsapdákat akasztanak a szőlőültetvények tartórendszerére (1 csapda 25–30 ha szőlőültetvényenként).