

Agrometeorológiai előrejelzés 2019 áprilisára

Автор(и): Растителна защита
Дата: 09.04.2019 Брой: 4/2019



Április elején a szezonra jellemzőtlenül a téli növények fejlődésének és a vetett tavaszi növényeknek a legtöbb szántóföldi területen a felső talajrétegek nedvességhiánya lesz a korlátozó tényező. A február és március havi csapadék alacsony mennyisége miatt az ország számos részén a 50 cm-es és 100 cm-es réteg talajnedvességkészletei a tavasz kezdetére nem elegendőek. A 50 cm-es réteg legkisebb nedvességkészletét a téli gabonanövények esetében a déli és keleti régiókban figyelik meg, helyenként a mezővízkapacitás (MVK) 60%-a alatt.

Az első évtized második felében csapadék várható, és javulás várható a mezőgazdasági növények vegetációjának feltételeiben. Ebben az időszakban a télen szárbokrosodott búza- és árpaállományok a szárhajtás stádiumába lépnek. A rozett stádiumban áttelelt repcében az ágazás és a rügyképződés zajlik. A

rügyképződés stádiumában (zöld rügytől a sárga rügyig) a legveszélyesebb kártevő, a repcevirágbogár támadja meg. Szükség esetén (gazdasági kárküszöb >5 bogár/növény) a rovarirtó kezelést a repcében a virágzás előtti stádiumban kell elvégezni.

A második és harmadik évtizedben az agrometeorológiai feltételek nagyon dinamikusak lesznek. A mezőgazdasági növények fejlődése mérsékelt ütemben fog zajlani, a klímai normákhoz közeli hőmérsékletek mellett. A várható, a norma körüli és alatti csapadék főként a 50 cm-es réteg nedvességgészleteit javítja. Ezek alapvető jelentőségűek lesznek a téli gabonanövények számára, amelyek túlnyomórészt a szárhajtás stádiumában lesznek. Ebben a stádiumban a növények talajnedvesség-igénye meredeken megnő. Április végén a legkorábban szárhajtott búzaállományok, amelyek március végén érték el ezt a stádiumot, a kalászerés stádiumába lépnek. A szárhajtás és a kalászerés közötti időszak kritikus a búza lisztharmat és barna rozsdá fertőzés szempontjából. Ebben az időszakban a napbogár, a gabonalevélbogár és a búzatripsz megjelenésének és kártevő tevékenységének monitorozása is szükséges.

Április második felében a repce túlnyomórészt virágzás stádiumában lesz. A napraforgóban és a kukoricában a vetés időpontjától függően a kelés és a levélképződés stádiumai figyelhetők meg.

A második évtized végéig nem zárható ki a fagyok kialakulásának lehetősége, amit figyelembe kell venni a zöldség- és dohánypalánták edzése során.

A második évtizedben a 10 cm mélységű talajhőmérséklet az alföldi régiókban eléri a szemkukorica vetéséhez megfelelő értékeket, a harmadik évtized végére pedig a hőkedvelő tavaszi növények (gyapot, bab, földimogyoró, görögdinnye, sárgadinnye) vetéséhez is.

A hónap során várható változékony időjárás, gyakori záporokkal, kedvező feltételeket teremt bizonyos gombabetegségek kialakulásához a gyümölcstermő növényekben (virág- és termés molyhásodás/korai barna rothadás, őszibarack levélhajlító, lyukasfoltosság, varasodás alma és körte esetében, birs terméshullása stb.). Megfelelő feltételek a növényvédő permetezések végrehajtásához a gyümölcsösökben április elején, valamint a második és harmadik évtized elején és végén alakulnak ki.