


Мájus elején megfelelő feltételek adódnak a szezonális agrotechnikai teendők végrehajtásához.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 01.05.2019 Брой: 5/2019



Április végén és május elején változás várható az agrometeorológiai viszonyokban. A előrejelzett hőmérséklet-emelkedés, együtt a korábbi időszakban felhalmozódott csapadékból eredően javult talajnedvesség-tartalékkal, feltételeket teremt a mezőgazdasági növények vegetációs folyamatainak gyorsulásához.

Az időszakban az észak-bulgáriai búza a szárhajtás stádiumában lesz, míg Dél-Bulgária egyes részein megkezdődik a kalászérés. A dunai síkság repceállományában a rügyezés és virágzás fázisai zajlanak le, Dél-Bulgáriában pedig tömegesen figyelhető meg a virágzás és a hüvelyek képződése. A napraforgóval bevetett

területeken levélképződés (1-2 pár igazi levél képződése) következik be. A kukoricánál a kelés és a levélképződés kezdete figyelhető meg.

A téli gabonanövényeknél a szárhajtás és a kalászerés stádiumaiban a gabonalevélbogár és a mezei poloska károsítja a növényeket. Az állományokat a lisztharmat megjelenése és fejlődése szempontjából is figyelemmel kell kísérni. Amikor a kártevők és betegségek fejlődése meghaladja a gazdasági károküszöböt, szükséges a növényvédő szerek kezeléseinek végrehajtása.

A gyümölcsfajoknál a virágzás befejezése után fungicidekkel történő kezeléseket végeznek a csonthéjasok virághalványulása (korai barna rothadás), a barack levélhajlás, valamint a almatermésűek varasodása ellen.

Kedvező feltételek a szezonális agrotechnikai tevékenységek (növényvédő permetezések, talajművelés gyümölcsösökben) végrehajtásához az időszak elején és végén állnak elő, amikor viszonylag stabilabb, csapadékmentes időjárás várható.

Forrás: NIMH