

A május első felében uralkodó párás időjárás előfeltétele a gomba eredetű kórokozók fejlődésének.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 07.05.2019 Брой: 5/2019



A nedves időjárás kedvező feltételeket teremt a gombás kórokozók megjelenéséhez és fejlődéséhez, amelyek megelőzése rendszeres fungicidek alkalmazását igényli.

Május 3–9. között dinamikus és változékony agrometeorológiai viszonyokat jósolnak. A növénytermesztési folyamatok az átlaghőmérsékletek éghajlati normák alatti értékei mellett, gyakori csapadékkal folytatódnak a szinoptikus előrejelzés szerint.

Az időszak első felében csapadék várható, az ország síkvidéki területein sok helyütt intenzív is, amely fenntartja a javult talajnedvesség-tartalékokat az elhárított kora tavaszi aszály után. A várt szeles idő további korlátokat szab a növényvédelmi tevékenységek végrehajtásának a téli gabonafélék, a repce állományában, valamint az állandó gyümölcsültetvényekben.

Az időszakban a búza a szárnyító, a szárnyító–búzakalász-átmenet és a búzakalász fejlődési stádiumaiban lesz. A repcében a virágzás, a hüvelyek képződése és növekedése figyelhető meg. A vetett tavaszi növényekben a levélképződés zajlik.

A nedves időjárás kedvező feltételeket teremt a gombás kórokozók megjelenéséhez és fejlődéséhez, amelyek megelőzése rendszeres fungicidek alkalmazását igényli.

Az időszak végén az agrometeorológiai viszonyok javulása várható (a hőmérsékletek emelkedésének kezdete, a szél csillapodása, a csapadék alacsony valószínűsége), és kedvezőbb lehetőségek teremtnének az agrotechnikai tevékenységek végrehajtására.

Forrás: OMSZ