

Agrometeorológiai előrejelzés május hónapra

Автор(и): Растителна защита
Дата: 10.05.2019 Брой: 5/2019



Május elején a mezőgazdasági növények fejlődése az átlagnál alacsonyabb hőmérsékletek mellett, és jó talajnedvesség-tartalékokkal fog folytatódni, ami az áprilisban az átlag feletti csapadékmennyiségnek köszönhető. Az április csapadékai (Pleven - 116 l/m², Veliko Tarnovo - 63 l/m², Lovech – 125 l/m², Razgrad - 64 l/m², Dobrich - 60 l/m², Sofia - 78 l/m², Sandanski - 58 l/m², Pazardzhik - 60 l/m², Plovdiv - 58 l/m², Haskovo - 89 l/m², Kardzhali - 75 l/m², Elhovo - 79 l/m², Stara Zagora - 55 l/m², Karnobat - 52 l/m²) döntő szerepet játszottak a kora tavaszi aszályt követően az őszi vetésű növények talajnedvesség-hiányának leküzdésében. A május első szakaszára előrejelzett csapadék nagyon jó szinten, a talaj 50 cm-es és 100 cm-es rétegében a teljes vízkapacitás (TÖK) 85%-a felett fogja tartani a nedvességtartalékokat. Ez a csapadék kedvező hatással lesz a téli gabonanövényekre és a repcére, amelyek fejlődésük szaporodási szakaszában vannak, és megnövekedett igényük van a talajnedvességre. Ebben az időszakban az ország mezőgazdasági területein a

búzában és az árpában a szárhajtás, a szárhajtásból a kalászszemzésbe való átmenet, valamint a kalászszemzés szakasza következik be. A repcében virágzás, megtermékenyítés és hüvelyek képződése zajlik.

Az első szakasz végén a magasabban fekvő területeken talajfagyokat jeleznek, amit figyelembe kell venni a zöldség- és dohánypalánták ültetésekor. A második szakasz első felében jelentős hőmérsékleti javulásra és a mezőgazdasági növények vegetációs folyamatainak felgyorsulására számíthatunk.

Május második felében az agrometeorológiai viszonyok továbbra is instabilak maradnak, gyakori csapadékkal. A mezőgazdasági növények fejlődése a klímái normák körüli és feletti hőmérsékletek mellett fog folytatódni. Ebben az időszakban a téli gabonanövényekben a szemképződés és a szemtöltődés nagyon jó és optimális talajnedvesség-tartalékok mellett zajlik majd. A harmadik szakasz végén a déli régiókban és a Duna-menti síkság egyes területein a búzában és az árpában a tejérettség szakaszának kezdetét figyelhetjük meg. A hónap során a kukoricában és a napraforgóban levélképződés zajlik. Május végén az agrotechnikai határidőn belül vetett napraforgóban virágzatképződés figyelhető meg. A májusban várható gyakori csapadék kedvező feltételeket teremt számos gombabetegség fertőzési hátterének növekedéséhez: a búzában a rozsdá (barna, sárga) és a fusáriumszív; a zöldségnövényekben és a szőlőben a lisztharmat; a csonthéjas gyümölcsökben a korai barna rothadás és a lyukasfoltosság, a almatermésűekben a varasodás stb. A hónap során a növényvédő permetezések végrehajtására alkalmasabb feltételek az első szakasz közepén, a második szakasz első felében és a harmadik szakaszban állnak elő.

Májusban fokozott jégesőveszélyt jeleznek. Részleges jégkár esetén célszerű az érintett növényállományt első adandó alkalommal réztartalmú gombaölő szerekkel kezelni a sebek gyorsabb gyógyulása és a másodlagos fertőzések kockázatának csökkentése érdekében.

Forrás: OMSZ