

Agrometeorológiai előrejelzés június hónapra

Автор(и): Растителна защита
Дата: 05.06.2019 Брой: 6/2019



Június legtöbb napján az agrometeorológiai viszonyokat instabil időjárás, egyenetlenül eloszló csapadék fogja meghatározni, ami jelentős különbségeket eredményez a talajvízkészlet szintjeiben is. Nyugat-Bulgáriában, ahol a júniusi csapadék, hasonlóan a májusihoz, várhatóan eléri és meghaladja a havi normát, nagyon jó talajvízkészletet jósolnak. A tavaszi növények esetében az 50 és 100 cm-es rétegben ez a mezős vízkapacitás (MVK) 80%-a felett fog maradni. Alacsonyabb talajvízkészlet-szintek várhatók a keleti régiókban, ahol júniusban kevesebb csapadékot is prognosztizálnak.

Az első és második tíz napos periódusban a mezőgazdasági növények fejlődése mérsékelt ütemben fog folyni, a klímai normákhoz közeli hőmérsékletek mellett. Június elején a magasabban fekvő területeken a téli gabonanövényekben a szemtöltés zajlik majd. Az alföldi területeken a búzánál a tejérettség megfigyelhető, míg

az árpa esetében – tejérettség és átmenet a viaszérettségbe. A búzánál, a szemtöltés – tejérettség interfázis ideje alatt a gabonapoloska (*Eurygaster integriceps*) lárvái okoznak komoly károkat. Ebben az időszakban a búzaállományokat fel kell mérni a kártevő jelenlétére, és a gazdasági kárküszöböt meghaladó sűrűség (2 lárva/m²) esetén rovarirtó kezelés elengedhetetlen.

Az első tíz nap végén és a második tíz nap elején az árpa túlnyomórészt viaszérettségben lesz, a repce pedig az érési szakaszban.

A harmadik tíz napos periódusban a mezőgazdasági növények fejlődése felgyorsult ütemben fog folyni, a normál feletti hőmérsékleti viszonyok mellett. E tíz nap első felében az alföldi területeken a búza eléri a viasz- és teljes érettséget. Június végére a tavaszi növények egy része a reprodukív fejlődési szakaszokba lép – a napraforgónál a virágzás kezdete következik be, a korai hibrid kukoricáknál pedig a virágzatképződés és a virágzat virágzása.

A hónap során a prognosztizált maximum hőmérsékletek, helyenként akár 35°C-ig, negatív hatással lesznek a zöldségnövények virágzására és termékenyítésére. A júniusi meteorológiai viszonyok fokozott fertőzési háttért tartanak fenn a gombás kórokozók esetében: késői barna rothadás a kései cseresznyefajtáknál, varasodás és lisztharmat a gyümölcsfákon, lisztharmat a szőlőültetvényekben és zöldségnövényekben. A szőlőben a virágzat virágzásától a borsószemméretű bogyóképződésig tartó interfázis kritikus a lisztharmat fertőzés szempontjából. Június első tíz napjában fokozott jégeső valószínűségét jósolják, ami a növények fekvése és a mezőgazdasági növények további károsodása veszélyével jár. Jégeső után a károsodott gyümölcs- és zöldségnövényeket első adandó alkalommal réztartalmú gombaölő szerekkel kell kezelni.

A hónap során a tavaszi növények vegetációs időszaki talajművelésének végrehajtására alkalmasabb feltételek a harmadik tíz napos periódusban állnak elő.

Forrás: NIMH