

Instabil időjárás és a normál feletti hőmérsékletek

Автор(и): Растителна защита
Дата: 26.06.2019 Брой: 6/2019



A hét napos időszak (2019.06.21–27.) legtöbb napján az agrometeorológiai viszonyokat instabil időjárás és a normál feletti hőmérsékletek határozzák majd meg. A nyár kezdetén az előrejelzett, helyenként 37–38°C-ot is elérő rendkívül magas maximum hőmérsékletek hátráltatják majd a tavaszi növények vegetációját. Ezek az értékek kedvezőtlenül hatnak néhány zöldségfélék (bab, paradicsom, paprika, uborka stb.) szaporodásának kialakulására, és alacsony légköri páratartalom mellett a virágok és terméskötések hullását okozhatják. Az időszak közepére hőmérséklet-csökkenés és a mezőgazdasági növények fejlődéséhez kedvezőbb feltételek javulása várható.

Az időszakban az alföldi területeken a búzában tömeges lágy szem és teljes érettség, a magasabban fekvő területeken pedig tejérettség és átmenet lágy szemállapotba figyelhető meg. A napraforgónál a virágzat kialakulása zajlik, helyenként a Duna-menti síkságon (a Băzovec, Pavlikeni agrometeorológiai állomásokon) pedig a virágzás kezdetét is megfigyelhetik az állományokban. A kukoricánál a levélképződés megy végbe. Az időszak végén a korai hibrideknél a bóbitázás kezdetét figyelhetik meg. A bóbitázásig a kukoricaállományokat át kell vizsgálni az egyik legjelentősebb gazdasági kártevő, a kukoricamolyl jelenléte szempontjából. Ha a kártevő sűrűsége meghaladja a gazdasági kárküszöböt (10 petecsomó 100 növényen), időben el kell végezni a rovarirtó kezelést (a fiatal lárvák ellen, mielőtt behatolnak a szárba).

Az időszak alatti csapadék az ország számos részén, a délkeleti régiók és a Fekete-tenger partvidéke kivételével, átmenetileg akadályozza majd az árpa és búza betakarítását. Ismételten fokozott jégesőveszélyt jeleznek előre, ami a növények kidőlésének és a szemek kihullásának kockázatával jár. Jégeső után ajánlott az érintett zöldségfélék és szőlőültetvények kezelése réztartalmú gombaölő szerekkel az első lehetőség szerint.

Forrás: NIMH