

Növekvő gombás kórokozók okozta fertőző háttér a zöldség- és gyümölcsstermesztésben

Автор(и): Растителна защита
Дата: 18.07.2019 Брой: 7/2019



A hét napos időszakban (július 19-25.) a mezőgazdasági növények fejlődése felgyorsult ütemben fog folytatódni a normál feletti hőmérsékletek mellett, és Dél-Bulgária egyes részein a 50 és 100 cm-es talajrétegekben jó nedvességtartalékokkal. A július második tíz napjában esett csapadék helyenként Dél-Bulgáriában meghaladta a 30-40 l/m²-t (Blagoevgrad - 41 l/m², Plovdiv - 34 l/m², Szliven - 56 l/m², Burgasz - 40 l/m², Kardzsali - 41 l/m² és Csirpan - 33 l/m²). Ez a csapadék kedvező hatással volt a tavaszi növényekre, amelyek a vízigényesebb reprodukzív növekedési fázisban vannak.

Az időszakban a napraforgó a szentöltődés fázisában lesz. A kukoricánál különböző fejlődési fázisok figyelhetők meg – a késői hibridék virágzásától és a bibeszár képződésétől az ország mezőgazdasági területein

termesztett korai kukorica-hibridek tejérlelési fázisáig. Július harmadik tíz napjában a vetési bab az érés fázisában lesz, a gyapot pedig a virágzás kezdetébe lép.

A közelgő időszakban az ország legnagyobb részén, néhány keleti régióbeli hely kivételével, viszonylag száraz időjárás várható, ami megfelelő feltételeket biztosít az idényjárásnak megfelelő agrotechnikai tevékenységek végrehajtásához, amelyek közül a legfontosabb a búza betakarításának befejezése. Jelenleg a NIMH agrometeorológiai állomásain elért búzatermés 420 kg/dka (Dolni Csiflik és Karnobat állomások) és 650 kg/dka (Glavinica állomás) között mozog.

Az időszakban a növényvédő kezeléseket a nap hűvösebb óráiban kell végezni, a növények érési idejéhez igazodó, megfelelő betakarítási tilalmi idővel rendelkező növényvédő szerekkel. A július első felében gyakori csapadék növelte egyes gombás kórokozók fertőzési hátterét: lisztharmat a zöldségnövényeken, késői barna rothadás a korai gyümölcsfajtákon (őszibarack, nektarin, szilva és körte). Július harmadik tíz napjában a gyümölcsültetvényekben nem szabad alábecsülni a gyümölcsmoly második generációjának ellenőrzését. Szőlőültetvényekben a lisztharmat (oidium) elleni kezeléseket kombinálhatjuk a atkák és a szőlőmoly második generációjának lárvái elleni kezelésekkal.

Forrás: NIMH