

Agrometeorológiai előrejelzés július végére

Автор(и): Растителна защита
Дата: 26.07.2019 Брой: 7/2019



Július végén a mezőgazdasági növények vegetációs folyamatai a klímai normák körüli hőmérsékletek mellett zajlanak le. Az időszak közepén várható csapadék, főleg Nyugat- és Közép-Bulgáriában, továbbra is biztosítani fogja a mezőgazdasági növények normális fejlődéséhez szükséges vízmennyiséget.

A napraforgónál a szemtöltődés fázisa zajlik, az időszak végén pedig az ország déli régióiban a beérési fázis is megkezdődik. A kukoricánál a hibrid korai érésétől függően különböző fenológiai fázisok figyelhetők meg – virágzás, selyemszál megjelenése és megbarnulása, tejérettség, valamint az átmenet a tejérettségből a sűrű tejérettségbe.

Az időszakban a zöldségfélék növényvédelmi teendőit a lisztharmat, valamint a levéltetvek és a kabócák elleni védekezésre célszerű irányítani, amelyek különféle vírusbetegségeket terjesztenek (paprika sárga üszkösödése, uborka mozaikvírus a burgonyafélék családjába tartozó zöldségféléknél). A szőlőültetvényeken a lisztharmat elleni védekező kezeléseket kell végrehajtani.

Az agrotechnikai tevékenységek (növényvédő permetezések és a búza betakarításának befejezése) végrehajtásához kedvező feltételek az időszak elején és végén állnak majd rendelkezésre, amikor csapadékmentes időjárás várható. Ismét előfordulhat jégeső, valamint az érett gyümölcs- és zöldségtermés minőségének romlása.

Forrás: NIMH