

Agrometeorológiai előrejelzés augusztusra

Автор(и): Растителна защита
Дата: 01.08.2019 Брой: 8/2019



Augusztus első tíz napjának legtöbb napján az időjárási körülményeket az ingatlan időjárás és az időszak normáját körülvevő, illetve az alatti hőmérsékletek határozzák majd meg. A hónap elején előrejelzett meteorológiai körülmények növelni fogják bizonyos gombás kórokozók fertőzési szintjét: a késői szántóföldi termelésű zöldségfélék varasodását, a gyümölcsösök késői barna rothadását, valamint az érésben lévő korai szőlőfajtákon a szürke penészt.

A július végén lehullott csapadék, amely helyenként az északnyugati és középső régiókban meghaladta a 30-40 l/m²-t (N. Selo, Vidin, Vraca, Montana, Lovecs, V. Tarnovo), valamint az augusztus első tíz napjára várható csapadék kedvező hatással lesz a második növényre és a későbbi kukoricahibridre, amelyekben a szemképződés és -töltődés zajlik majd. A tíz nap alatt a közepesen korai kukoricahibridek tejérlelési stádiumban

lesznek, míg a korai hibridek viasz- és teljes érési stádiumba lépnek (Bazovec, Kneja, Glavinica, Pazardzsik, Plovdiv agrometeorológiai állomások). A napraforgónál a Duna-menti síkságon és a déli régiókban az érési stádium következik be.

Az első tíz nap végén jelentős hőmérséklet-emelkedés várható, valamint a késői szántóföldi növények fejlődésének utolsó stádiumainak felgyorsult lefolyása. A második és harmadik tíz nap alatt az időjárási körülményeket viszonylag száraz időjárás és a klímai normákat körülvevő, illetve azokat meghaladó hőmérsékletek határozzák majd meg.

Augusztus második felében a késői szántóföldi növények nagy része befejezi fejlődését. A napraforgónál tömeges technikai érés figyelhető meg, a szójánál pedig az érési stádium. A hónap végén a közepesen késői kukoricahibrideknél a viaszerés lesz túlsúlyban. A rizsnél a tejérlelési stádium következik be, a gyapotnál pedig a tokok felnyílása.

A hónap második felében mélyülni fog a talajnedvesség hiánya a második növényekben, ami megnövelt öntözési arányokat tesz szükségessé. A szántóföldi régiók számos helyén a felső talajrétegek nedvességhiánya hátráltatja majd a téli repce vetésére kijelölt területek mélyszántásának és vetés előtti talajművelésének minőségi elvégzését. A repce agrotechnikai vetési időszaka augusztus harmadik tíz napjában kezdődik.

Augusztusban a késői gyümölcsfafajtáknál nem szabad alábecsülni a gyümölcsmoly utolsó nemzedékének káros tevékenységét. A hónap legtöbb napján tapasztalható viszonylag száraz időjárás előfeltétele lehet az atkák populációjának növekedésének. A szőlőültetvényekben szükséges figyelemmel kísérni az szőlőmoly harmadik nemzedékének lárváinak megjelenését és sűrűségét. A növényvédő permetezést a nap hűvösebb óráiban kell elvégezni, megfelelő betakarítás előtti időtartammal rendelkező termékekkel, a növények érési idejének megfelelően.

Forrás: NIMH