

Agrometeorológiai előrejelzés augusztus végére

Автор(и): Растителна защита
Дата: 30.08.2019 Брой: 8/2019



Augusztus végén a forró és száraz időjárás továbbra is meghatározza az agrometeorológiai viszonyokat. A hónap eleje óta tapasztalható, mezőgazdaságilag jelentős csapadék hiánya – kivéve Dél-Bulgária bizonyos területeit (Kardzsali – 41 l/m², Haszkovo – 18 l/m² és Elhovo – 13 l/m²) –, valamint az előrejelzett száraz időjárás a következő napokban tovább mélyíti a mezőgazdasági növények talajvíz-készletének hiányát.

Az időszakban a kukorica a tej-, tészta- és teljes érési fázisban lesz a hibrid koraiságától függően. A napraforgó általában befejezte fenológiai fejlődését. A betakarítás során ajánlott a mag nedvességtartalma 8–9% között legyen, a körülményektől és a termény tárolási idejétől függően. Szilva, körte, alma és őszibarack ültetvényekben a gyümölcserés zajlik. Asztali szőlőfajtáknál az időszak végéig figyelhető meg az érés, míg a vörösbőr szőlőfajtáknál a bogyószíneződés következik be.

Az időszakban az agrotechnikai tevékenységek a tavaszi vetésre szánt tarlók mélyszántásához, a téli repce vetőágyainak előkészítéséhez és vetéséhez, valamint a napraforgó betakarításához kapcsolódnak. Az alacsony talajnedvesség hátráltatja a mechanikai talajművelés minőségi elvégzését. A növényvédelmi tevékenységek a zöldségnövények betegségektől és kártevőktől (lisztharmatok, levéltetvek, atkák) való védelmére, valamint a szőlőültetvények lisztharmat elleni védelmére irányulnak. A növényvédő szerek kijuttatását a nap hűvösebb óráiban és szélcsendben kell végezni.

A tűzveszély foka továbbra is magas.