

Agrometeorológiai előrejelzés szeptemberre

Автор(и): Растителна защита
Дата: 16.09.2019 Брой: 9/2019



Szeptember elején a mezőgazdasági meteorológiai feltételeket száraz, meleg, és az alföldi területek nagy részén forró időjárás fogja meghatározni, ami felgyorsítja a késői szántóföldi növények fejlődésének utolsó szakaszait. A hónap első hetében a középkésői kukorica hibridek viasz- és teljes érettséget érnek el, míg a késői hibridek a tejféléssel és az átmenettel a viaszérettségre lesznek.

Az első évtized napjain többségén a feltételek továbbra is kedvezőek maradnak a napraforgó betakarításának, valamint a korábbi kukorica hibridekkel bevetett területek felszabadításának. Az évtized végére hőmérséklet-csökkenés és a mezőgazdasági meteorológiai feltételek megváltozása várható. A várt csapadék, a nyárvégi fokozódó aszály után, javítani fogja a talaj felső rétegeinek állapotát, ami előfeltétele a minőségibb őszi vetés

előkészítő talajművelésnek és az őszi repce vetésének. A repce vetésének optimális agrotechnikai időszaka szeptember második évtizedének végéig tart.

A második és harmadik évtizedben a mezőgazdasági meteorológiai feltételeket az éghajlati normákhoz közeli hőmérsékletek fogják meghatározni. Szeptember közepéig a késői kukoricahibridek befejezik fejlődésüket; a rizs viasz- és teljes érettségben lesz, a cukorrépa pedig eléri a technikai érettséget. A harmadik évtizedben, a szokásos időpontoknál korábban, a késői szőlőfajták eléri a technológiai érettséget. A gyapot az érés szakaszában lesz.

A második évtized második felében és a harmadik évtized elején várható csapadék kiemelten fontos lesz a repce normális csírázásához. Azokon a területeken, ahol a nedvesség nem korlátozó tényező, az agrotechnikai határidőn belül vetett állományokban a csírázási szakaszt szeptember végén fogják megfigyelni. A csírázási szakaszban komoly károkat okoz a repce földibolha (imágó) és a repce levéldarázs (álhernyó), ami megfigyelést igényel ebben a szakaszban a kártevők előfordulásának és egyedsűrűségének meghatározására. Ha a sűrűség meghaladja a gazdasági kárküszöböt (a repce földibolha esetében - 2 bogár/m²; a repce levéldarázs esetében 2-3 álhernyó/m²), a kezelés kötelező.

Szeptemberben a késői szántóföldi termesztésű zöldségnövények esetében nem szabad alábecsülni a gyapottok-bagolylepke harmadik nemzedékének hernyói elleni növényvédő kezeléseket, mivel ezek károkat okoznak és rontják a zöldségtermés minőségét.

A hónap harmadik évtizedében a magasabban fekvő területeken nem zárható ki a fagy kialakulásának lehetősége, amit figyelembe kell venni a fagyérzékeny zöldségnövények (paradicsom, paprika) betakarításánál.

Forrás: OMSZ