

Őszi növényvédelmi tevékenységek a gyümölcsösben

Автор(и): д-р Елена Манчева, Виола АЕ – Сливен

Дата: 26.09.2019 Брой: 9/2019



Szeptemberben folytatódik a nyári-őszi szárazság. Kifejezettebben érezhető a keleti régiókban, ahol az átlagos havi csapadékmennyiség 25-30 l/nm. Az ország nyugati részén nem haladja meg a 40-50 l/nm-t.

Egyes években az átlagos havi csapadékmennyiség 5 és 10 l/nm között mozog. A napi átlaghőmérséklet 15-20 °C, szeptember 20. után pedig közel 2-3 °C-kal csökken. A legmagasabb napi hőmérséklet 28-32 °C-ot ér el, a legalacsonyabb átlaghőmérséklet pedig 3 és 8 °C között van.

Ezekben az éghajlati viszonyokban a környezet kedvező a többgenerációs rovarok és atkák megjelenéséhez és szaporodásához. Ezek fejlesztik utolsó generációikat, és e populációk sűrűsége nagyban meghatározza a

következő évi károsítás mértékét. A hónap során kedvező feltételek alakulnak ki a bőséges harmat képződéséhez, amely alma- és körtevarasodás, a késői paradicsomok késői hervadása és egyéb betegségek fertőzésének oka.

Alma és körte

A hónap elején figyelemmel kell kísérni a almamoly (a második, részben a harmadik nemzedék befejeződése) rajzását, és szükség esetén kezeléseket kell végezni.

Az alapos ellenőrzés és a késői varas fertőzések kimutatása, valamint a termény tárolása során fellépő betegségek elleni védekezés céljából kezeléseket végeznek Topsin M 70 WG - 0,1% vagy Top plus 70 WP - 0,1% készítményekkel. Az alma és körte jó tárolhatósága, valamint a tárolás során fellépő rothadások és penészgombák csökkentése érdekében célszerű egy utókezelést is végezni Topsin M 70 WG - 0,120%-os készítménnyel. A permetezés után a gyümölcsöket megszáritják, majd hűtőkamrákba vagy mély, hűvös pincelokálisokba helyezik.

Szőlőültetvények

Ebben az időszakban a szürkepenész jelentős kárt okoz a szőlőben a bogyók színeződésétől a fogyasztásig. Ezért szeptember nedves és hűvös időjárása esetén kezeléseket végeznek Topsin M 70 WG - 0,2%-os készítménnyel. Ekkor rajzik a szőlőmoly harmadik nemzedékének imágója is. A hernyók károsítják az érésben lévő vagy már érett szőlőbogyókat. A kártevő elleni védekezés céljából a gombaölő permetléhez regisztrált piretroidot adnak.

Az egyéves szőlőtőkék 3-5 cm földdel fedik be az oltás helye fölé. Ezt a műveletet szeptember végén végzik.

A Növényvédelmi Törvény értelmében a termelők kötelesek kizárólag az adott növényre és kártevőre engedélyezett, és a megfelelő adagban alkalmazható növényvédő szert használni.

A forgalomba hozatalra engedélyezett növényvédő szerek listája közzétételre kerül a Bolgár Élelmiszerbiztonsági Hatóság honlapján, a következő elektronikus címen: <http://www.babh.government.bg/> vagy a "A forgalomba hozatalra és felhasználásra engedélyezett növényvédő szerek listája" 2019. évi kiadványban.

A növényvédő szereket kizárólag engedéllyel rendelkező kereskedelmi vállalatoktól szabad megvásárolni!

Figyelem! Növényvédő szerek használata során be kell tartani a munkavédelmi előírásokat, a méhcsaládok mérgezésétől való védelmét, valamint a környezetszennyezés megelőzésére vonatkozó összes követelményt!