

Agrometeorológiai előrejelzés szeptember végére és október elejére

Автор(и): Растителна защита
Дата: 30.09.2019 Брой: 9/2019



A mélyülő aszályt követően az elmúlt hétnapos időszakban hullott csapadék pozitív változást hozott a talaj felső rétegének vízfizikai állapotában. A nyár végén a száraz és tömörödött talaj megnehezítette, és az északkeleti régiók egy részében (Szilisztra agrometeorológiai állomás) teljesen megakadályozta a repce és a téli gabonanövények vetésére szánt területek mélyszántását és vetés előtti talajművelését. Emiatt sok helyen elmulasztották a téli repce – a precíziós talajművelést igénylő növény – vetésének agrotechnikai határidejét.

Az időszak (szeptember vége – október eleje) legtöbb napján az agrometeorológiai viszonyokat az évszakhoz képest viszonylag száraz és meleg időjárás fogja meghatározni. A prognosztizált hőmérsékletek, melyek maximális értéke egyes helyeken akár 30-31°C is lehet, felgyorsítják a késői mezőgazdasági növények érési

фolyamatait, és hozzájárulnak több cukor képződéséhez a késői gyümölcstermő fajták és szőlők termésében. Az időszak alatt a vörösbor szőlőfajták nagy része technológiai érettséget ér el, az őszi gyümölcstermő fajták pedig szüreti érettséget. Szeptember végén és október elején a körteültetvényeket figyelni kell egy veszélyes kártevő, a körte rügylakó (*Anthonomus cinctus*) megjelenése miatt. Ennek a kártevőnek a védekezése az imágók ellen történik ősz elején.

A következő időszakban a feltételek lehetővé teszik a szezonális agrotechnikai tevékenységek végrehajtását. Az időszak egybeesik a téli gabonanövények vetésének optimális idejével a magasabban fekvő mezőkön. Október elején kezdődik a búza vetésének agrotechnikai határideje Észak-Bulgáriában.

Forrás: NIMH