

Agrometeorológiai előrejelzés októberre

Автор(и): Растителна защита
Дата: 11.10.2019 Брой: 10/2019



Októberben az agrometeorológiai feltételeket a klímanorma körüli és feletti hőmérsékletek, valamint a havi átlagokhoz közeli csapadék fogja meghatározni.

Október elején a normál feletti, maximum 29-30°C-ig terjedő előrejelzett hőmérsékletek felgyorsítják a kései gyümölcsfajták és szőlők érését, és előfeltételt teremtenek a kései zöldségfélék további termésének kialakulásához.

Az első évtized második felében tapasztalható időszaknak nem megfelelő meleg időjárás után a hőmérsékleti viszonyok normalizálódása várható. A szeptember végi csapadék és az október első tíz napjára várható esőzések nedvességet biztosítanak az őszi elején bevetett növények keléséhez. A nyár végi aszály az ország

számos részén késleltette az őszi vetésre szánt területek vetés előtti művelését. Emiatt a vetésterületek nagy részén a tépirapa agrotechnikai vetési határideje kimaradt. Október az optimális időszak a téli gabonanövények vetésére. Az első évtizedben van a búza agrotechnikai vetési ideje Észak-Bulgáriában, október 15. és 25. között Dél-Bulgáriában, a hónap végén pedig a Fekete-tenger partvidékén.

A második és harmadik évtized napjainak nagy részén a betakarított repce és téli gabonanövények fejlődése mérsékelt ütemben fog folyni, a normához közeli hőmérsékleti viszonyok között. Az október második felében előrejelzett csapadék várhatóan javítja a 50 cm-es réteg talajnedvesség-tartalékainak szintjét és az őszi növények vegetációjának kezdeti fázisainak lefolyásához szükséges feltételeket. A hónap végén a búzában a vetési időponttól függően a következő fejlődési szakaszok figyelhetők meg: kelés, harmadik levél és a szárazás kezdete, főként október elején bevetett állományokban. A repcében a levélképzés folyamatban lesz. Október végén a szeptemberben bevetett legkorábbi repceállományokban a rozettaképzési szakasz kezdete figyelhető meg.

Októberben számos kártevő támadja meg az őszi növényeket. A téli gabonanövényeknél figyelemmel kell kísérni a mezei pocok, a búzalevélbogár és a gabonalégy káros tevékenységét, és ha a kártevők száma meghaladja a gazdasági kárküszöböt (EIL), időben el kell végezni a kezelést. A mezei pocok esetében az EIL 2 aktív kolónia/decár; a búzalevélbogár esetében – 3 lárva/nm.

A repcében a hónap során felméréseket kell végezni a káposztabolha (imágók) és a repcelisztevő (álhernyók) előfordulására, és ha számuk meghaladja az EIL-t, rovarirtó permetezést kell végezni.

Forrás: NIMH