

Agrometeorológiai előrejelzés október végére

Автор(и): Растителна защита
Дата: 25.10.2019 Брой: 10/2019



A következő időszak legtöbb napján a száraz és az évszakhoz képest meleg időjárás fogja meghatározni az agrometeorológiai feltételeket, ami a nedvességhiány elmélyüléséhez vezet az őszi növényeknél. Az ország nagy részén, különösen Északnyugat-Bulgária egyes területein – a Kneja és Băzovec agrometeorológiai állomásokon, a Szófiai-síkságon – a Lozen agrometeorológiai állomáson, valamint a Felső-Trákiai-alföldön – a Plovdiv, Pazardzjik és Szliven agrometeorológiai állomásokon, a talaj 50 cm-es rétegében a nedvességtartalék alacsony, a mezővízkapacitás 45–50%-a alatt van, és egyes helyeken teljesen kimerült. Ezeken a területeken a nedvességhiány korlátozni és késleltetni fogja a búza, az árpa és az őszi repce fejlődését.

Az időszak végén előrejelzett csapadéknak nem lesz gazdasági jelentősége. A Duna-síkság egyes területein valós veszély forog fenn a kicsírázott őszi gabonanövények egy részének kiszáradására.

A fokozódó szárazság ellenére kivételek vannak az ország legdélebbi és délkeleti régióiban, ahol október első tíz napjában jelentősebb csapadék hullott – több mint 25–30 l/m² – Szandanszki, Kardzsali, Haszkovo, Elhovo és Burgasz. Ezek javították a vetés, valamint a bevetett őszi növények vegetációjának kezdeti szakaszának feltételeit.

A következő időszakban azokon a területeken, ahol a nedvesség nem korlátozó tényező, a búzánál és az árpánál a kelés és a levélképzés kezdete figyelhető meg. A déli régiók növényeinek egy része, főleg azok, amelyeket október elején vetettek, belép a harmadik levél stádiumba – a Karnobat agrometeorológiai állomás.

Október utolsó hetében a feltételek kedvezőek lesznek a késői tömeges növények területeinek tisztítására, valamint az ősztéli fajtájú gyümölcsfák termésének betakarítására. Az időszak alkalmas a málna és a feketeribizke ültetésére.

Forrás: OMSZ