

Agrometeorológiai előrejelzés november elejére

Автор(и): Растителна защита
Дата: 05.11.2019 Брой: 11/2019



Az elmúlt időszak végén 10 és 20 l/m² közötti csapadék hullott Északkelet- és Északnyugat-Bulgáriában: Novo Selo – 10 l/m², Vidin – 16 l/m², Ruse – 11 l/m², Razgrad – 10 l/m² és Silistra – 20 l/m², ami átmenetileg javította a téli gabonanövények fejlődésének kezdeti szakaszaihoz szükséges feltételeket. Az ország többi régiójában a csapadék elhanyagolható volt, és ott a mezőgazdasági növények fejlődése nehézségek közepette folyik a talajnedvesség hiánya miatt.

A következő hétnapos időszakban a mezőgazdasági meteorológiai viszonyokat meleg és túlnyomórészt száraz időjárás fogja meghatározni. A mezőgazdasági növények fejlődése, ahol a talajnedvesség nem korlátozó tényező, normális ütemben fog folyni a klímánorma körüli és feletti hőmérsékleten. A búzára nézve a pavlikeni és haskovói agrometeorológiai állomásokon a kelés fázisa figyelhető meg, a novachenei és silistrai

agrometeorológiai állomásokon a levélképzés kezdete, míg a karnobati, glavinitjai és yamboli agrometeorológiai állomásokon a harmadik levél.

November elején kedvezőek lesznek a feltételek a tavaszi növények számára kijelölt földterületek talajműveléséhez, a fiatal gyümölcsfák ültetéséhez, valamint a gyümölcsfák permetezéséhez 5%-os karbamid-oldattal a tömeges levélhullás után. A kezeléseket szélcsendes időben, legfeljebb 2–3 m/s szélsébségnél kell végezni.

Forrás: NIMH