

# Agrometeorológiai előrejelzés novemberre

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 13.11.2019 Брой: 11/2019



A hosszú őszi szárazság késleltette a téli gabonafélék és a repce fejlődését, és kétségessé tette a kelt növényállomány egy részének túlélését. A búza 50 cm-es és 100 cm-es talajrétegében a talajnedvesség-tartalom szokatlanul alacsony az ország nagy részén az ősz közepére. Északnyugat-Bulgária, a Szófiai-mező és a Felső-Trákiai-alföld egyes területein (agrometeorológiai állomások: Knezha, Băzovec, Lozen, Plovdiv, Pazardzhik, Sliven) a talajnedvesség-tartalék szintje az egy méteres talajrétegben a mezővízkapacitás 50%-a alatt van.

November első felében az agrometeorológiai feltételeket az átlag feletti hőmérsékletek határozzák majd meg. Az előrejelzett csapadék az első tíz nap elején és végén, a művelés alá vont területek nagy részén, nem lesz elegendő a téli gabonafélék és a repce felső talajrétegeiben uralkodó nedvességhiány megszüntetéséhez.

Agronómiai jelentőségű csapadék és a talajnedvesség-tartalékok jelentős növekedése várható a 50 cm-es rétegben november második felében. E periódus napjain többségén a téli gabonafélék és a repce fejlődése a művelés alá vont területeken a napi középhőmérséklet éghajlati normákhoz közeli értékeinél fog zajlani.

A második tíz nap végén jelentős hőmérsékletcsökkenés várható, és a magasabban fekvő területeken, ahol a hóesés sem kizárt, az őszi növények vegetatív folyamatai leállnak.

November harmadik tíz napjában az őszi növények fejlődése a művelés alá vont területek nagy részén lassú ütemben fog zajlani, a búza, az árpa és a téli repce vegetációjához szükséges biológiai minimumhoz közeli hőmérsékleteken. Az őszi növények aktívabb vegetatív folyamataihoz kedvezőbb feltételek főként az ország déli és délkeleti régióiban alakulnak ki. November végén a búzánál és az árpánál a harmadik levél kifejlődési szakasza lesz túlnyomó. A később, novemberben vetett állományoknál a kelési szakaszt fogják megfigyelni. A téli gabonafélék egy részénél a legdélebbi és legkeletibb régiókban, amelyek októberben 2-3 levelet fejlesztettek, a szárhasadási szakaszt fogják megfigyelni. A repcénél az őszi szárazság következtében csak az állományok kis része képes november végére a rozettaképződés kezdeti szakaszába (5-6 levél) lépni.

A hónap során előrejelzett minimum hőmérsékletek, mínusz 5–8°C között, a kritikus szint felett vannak a késleltetett, kelési szakaszban lévő téli gabonafélék esetében.

Kedvezőbb feltételek a gyümölcsfák ültetéséhez és az őszi növényvédő permetezések novemberi elvégzéséhez a hónap első felében állnak majd elő.

November első két hetében folytatni kell az őszi növények, különösen a monokultúrában termesztettek megfigyelését egyes kártevők (gabonamolyok, mezei pocok, repce darázs (álhernyók)) egyedsűrűségének meghatározása érdekében, és ha számuk meghaladja a gazdasági kárküszöböt (EIL), időben el kell végezni a kezelést. A mezei pocok esetében a gazdasági kárküszöb 2 aktív kolónia holdanként, a repce darázs lárvái (álhernyók) esetében pedig 2–3 példány négyzetméterenként.