

Kakasláb köles (Közönséges kakaslábfű - *Echinochloa crus-* *galli*)

Автор(и): доц. Ганка Баева
Дата: 26.01.2014 Брой: 1/2014



A nemzetség neve – *Echinochloa* – a görög szavakból származik: *echinos* – tüskés, és *chlce* – fű, azaz tüskés fű. A kakaslábű egynyári, késő tavaszi gyomnövény. Térdesen hajlott, aljától elágazó szára 80-100 cm magasra nő. Levelei szélesen szálalakúak. Virágzata 8-10 ágú buga, melyek álfüzérekbe alkotnak. A kalászkapelyvák rozsdabarnák és merev serteszerű szőrökkel borítottak. A szemtermés tojásdad alakú, világosbarna. A kakaslábű minden talajtípuson megél, de előnyben részesíti a tápdúsabb, enyhén savanyú, homokos-alluviális talajokat. Magokkal szaporodik, melyeket a szél, víz és állatok terjesztenek. A magok 25°C feletti hőmérsékleten, főleg a talaj felső néhány centiméteréből csíráznak. A talajban akár 8 évig is megőrzik csírázókéességüket. A gyom júliustól októberig virágzik és terem. Egy növény 2850-5700 és akár 51 ezer magot is képez. A kakaslábű nedvességkedvelő, nitrogénkedvelő, melegkedvelő és fénykedvelő faj. Tápdús talajok jelzőnövénye.