

Az előtéli hidegálló zöldségfélék vetéséhez megfelelő körülményekkel jellemezhető időszak

Автор(и): Растителна защита
Дата: 15.12.2019 Брой: 12/2019



December második tíznapos időszakában az időjárás szezonálisan enyhe jellege határozza meg az agrometeorológiai viszonyokat. Az ország szántóterületein pozitív minimumhőmérsékletek, valamint a téli gabonafélék vegetációs folyamatainak újraindításához szükséges biológiai minimum körüli és feletti napi középhőmérsékletek várhatók. A késleltetett vegetációra vonatkozó feltételek a búzában és az árpában főként a déli régiókban és a Fekete-tenger partvidékén alakulnak ki. A második tíznapos időszak végén a harmadik levélképződési fázis lesz jellemző a téli gabonafélékre. A novemberben vetett állományok nem megfelelően alakultak ki, csírázási és kezdeti levélképződési fázisban vannak. A szárhajtás fázisában lévő búza, amely a

sikeres telelés előfeltétele, az ország keleti régióinak egy részében (Glavinitsa, Szilisztra, Tsarev Brod, D. Chiflik, Karnobat) és helyenként a Duna-síkságon (Novachene) fordul elő.

A hosszú őszi szárazság következtében a búzaállományok egyenetlen sűrűségűek. A négyzetméterenkénti száruk száma 350 és 550–600 között változik.

A repcében csak az állományok egy része fejlődött ki rozettát őszi vegetációja során, ami egy olyan növekedési fázis, amelyben a növények sikeresen telelnek át.

Az időszak alatt nem várható jelentős csapadék, és a szántóterületek sok helyén a feltételek lehetővé teszik a tavaszi növények számára kijelölt területek mélyszántását. A déli régiókban az elkövetkező időszak alkalmas néhány fagyűrő zöldségfélék – borsó, lóbab, sárgarépa és mások – téli elővetésének elvégzésére.

Forrás: OMSZ