

Agrometeorológiai előrejelzés az év végére

Автор(и): Растителна защита
Дата: 30.12.2019 Брой: 12/2019



A december második tíznapjára jellemző időszakhoz képest szokatlanul meleg időjárás, mely során az alföldi területek sok helyén a maximum hőmérséklet meghaladta a 16-17°C-ot, a téli gabonafélék vegetatív folyamatainak újraindulásához vezetett. A decemberi átlagnál magasabb hőmérsékletek kedvező hatással voltak a későn vetett búzaállományokra, és ezek egy része elérte a 3. levélállománynak megfelelő növekedési fázisba lépéshez szükséges hőösszeget. Északkelet-Bulgária egyes helyein (Razgrad, Dobrich, Varna), ahol körülbelül 19-20°C-os hőmérsékleteket regisztráltak, a szárbokrosodási stádiumban lévő búzaállományok aránya is növekedett. A déli régiókban tapasztalt magas hőmérsékletek következtében egyes korai virágzású cserjefajoknál és fajoknál (som, cseresznye) kíváncsi rügyduzzadás indult be.

December harmadik tíznapjának elején a hőmérsékletek ismét az átlag felett voltak, és a legtöbb alföldi területen a napi átlagértékek meghaladták azt a biológiai minimumot, amely a téli gabonafélékben késleltetett vegetáció kialakulásához szükséges.

December harmadik tíznapjának közepén tapasztalt szokatlanul meleg időjárást követően az agrometeorológiai viszonyok lényeges változáson mennek keresztül. Az időszak végén várható lehűlés a őszi vetésű növények vegetatív folyamatainak gyengüléséhez és leállításához vezet, és megakadályozza egyes évelő ültetvények korai, kívánatlan fejlődését, ami teljesítőképességük csökkenését eredményezné.

Az alföldi területeken a feltételek lehetővé teszik a talajművelési munkák elvégzését. December harmadik tíznapjára előrejelzett csapadék növeli a 50 cm-es talajrétegben lévő talajnedvesség-tartalékok szintjét. Az őszi végén a déli régiók egyes helyein – a Kyustendil, Chirpan és Sliven agrometeorológiai állomásokon – a búza számára a 100 cm-es rétegben a talajnedvesség-tartalékok kielégítőtlenek, a mezőtartókéesség 60%-a alatt vannak.

Forrás: NIMH