

Januárt nagyon alacsony minimumhőmérsékletekkel köszöntjük

Автор(и): Растителна защита
Дата: 01.01.2020 Брой: 1/2020



A hónap során előrejelzett, akár mínusz 15°C-ig érő minimális hőmérsékletek, hó nélküli körülmények között és hosszabb ideig tartóan, kritikusak lesznek azokra a téli gabonanövényekre, amelyek az őszi vegetáció során nem tudták elérni a szárhasadás stádiumát. Ezek az értékek kritikusak lesznek az elmaradott fejlődésű téli repceállományokra is, amelyek az őszi szárazság következtében nem képeztek 7-8 levélből álló rozettát – ebben a stádiumban telelnek át sikeresen a növények.

A decemberi magas hőmérsékletek meghosszabbították az őszi vetésű növények vegetációját. A normál feletti hőmérsékletek következtében Nyugat-Bulgáriában, a knejai, szófiai és kjustendili agrometeorológiai állomásokon a későn kelt téli gabonanövények egy része 2-3 levelet fejlesztett ki.

Januárban az agrometeorológiai viszonyokat a klimatikus normák körüli és feletti hőmérsékletek fogják meghatározni, amelyek az őszi vetésű növényeket és a többéves ültetvényeket nyugalmi állapotban tartják. A téli gabonanövények a év legridegebb hónapját különböző fenológiai stádiumokban lépik meg – ez az őszi szárazság és a késleltetett vetés következménye. Az állományok jelentős része háromleveles stádiumban fog áttelelni. A szárhasadás stádiumában, amely a megfelelő telelési stádium, Kelet-Bulgária, Szilisztrá, Glavinica, Carev Brod, Dolni Csiflik, Jambol és Karnobat területén a búzaállományok nagy része van. Gyengébb, a kelési és kezdeti levélképződés stádiumában vannak a Duna-menti síkság egyes területein, a nikolaevói és pavlikeni agrometeorológiai állomásokon a késői (novemberben vetett) téli gabonanövények egy része.

A hónap során előrejelzett, akár mínusz 15°C-ig érő minimális hőmérsékletek, hó nélküli körülmények között és hosszabb ideig tartóan, kritikusak lesznek azokra a téli gabonanövényekre, amelyek az őszi vegetáció során nem tudták elérni a szárhasadás stádiumát. Ezek az értékek kritikusak lesznek az elmaradott fejlődésű téli repceállományokra is, amelyek az őszi szárazság következtében nem képeztek 7-8 levélből álló rozettát – ebben a stádiumban telelnék át sikeresen a növények.

A januári, a normát körülvevő és az alatti csapadék növelni fogja a talaj nedvességtartalékát az 50 cm-es és 100 cm-es rétegekben. A tél kezdetén az ország nagy részén a méterenkénti talajréteg nedvességtartalékának szintje rendkívül alacsony az évszakra jellemzőhöz képest. Nyugat-Bulgária egyes területein, a knejai és kjusztendili agrometeorológiai állomásokon, valamint néhány keleti régióban, a razgradi és szlivéni agrometeorológiai állomásokon ez az érték a teljes víztartó képesség (TÖK) 65%-a alatt van.

Januárban a szőlők és gyümölcsösök téli metszésére alkalmasabb körülmények a hónap második felében állnak elő.

Forrás: NIMH