

Agrometeorológiai előrejelzés január végére és február elejére

Автор(и): Растителна защита
Дата: 04.02.2020 Брой: 2/2020



Az időszakban a mezőgazdasági területeken az átlag feletti hőmérsékletek következtében az őszi vetésű növények mély álomból relatív nyugalmi állapotba kerülnek át. A Duna-síkság és a keleti régiók egyes területein, ahol maximum 14-15°C-ot előrejelzettek, a napi középhőmérséklet eléri és meghaladja a téli gabonanövények vegetációs folyamatainak folytatásához szükséges biológiai minimumot. Ezek az átlag feletti hőmérsékletek elsősorban a csírázás és 1-2 levél stádiumában levő elmaradott állományokat érintik. A búza jelentős része a harmadik levél és a szárhasítás stádiumában fejezte be őszi vegetációját.

A következő időszakban várható csapadék gazdasági szempontból jelentéktelen lesz, és az őszi növények talajvízkészlete a mezőgazdasági területeken a szezonra nézve szokatlanul alacsony marad. Január második

tíz napos időszakának végén néhány keleti régióban (Razgrad, Sliven) az 50 és 100 cm-es rétegek nedvességtartalma a mezővízkapacitás 60%-a alá csökkent.

Február elején a szezonra nézve meleg időjárás határozza meg az agrometeorológiai viszonyokat. Február első tíz napos időszakának közepéig az ország nagy részében körülbelül 18-20°C maximum hőmérsékletet, valamint a téli gabonanövények vegetációjához szükséges biológiai minimum feletti 4-5°C napi középhőmérsékletet jósolnak. E szezonra szokatlanul magas hőmérsékletek mellett a mezőgazdasági területek nagy részén az őszi vetésű növények vegetációs folyamatainak folytatását a felső talajrétegek nedvességhiánya korlátozza, ami a januári szegényes, kevés kivétellel 10 l/m² alatti csapadék következménye. Nedvességhiány miatt egyes területeken részleges búzaállomány-sárgulás figyelhető meg.

A jelenlegi hét végén jelentős változás várható az agrometeorológiai viszonyokban. Az előrejelzett éles hőmérséklet-csökkenés akadályozni fogja egyes korai virágzású gyümölcsfák idő előtt megkezdett rügyduzzadását. Eső és hó csapadék várható, valamint javulnak a mezőgazdasági növények áttelelési feltételei.

Az időszak legtöbb napján a körülmények lehetővé teszik a metszést a szőlőskertekben és gyümölcsösökben. A gyümölcstermesztésben a ritkítást és rövidítést végző metszéssel együtt fitosz sanitárius metszést is végeznek – a mumifikálódott, kiszáradt és betegséggel fertőzött ágakat és hajtásokat megsemmisítik. A fitosz sanitárius metszés során a vágást a károsodott résztől 30-40 cm távolságra kell elvégezni, és a szerszámokat minden egyes vágás után fertőtleníteni kell.

Forrás: OMSZ