

Agrometeorológiai előrejelzés februárra

Автор(и): Растителна защита
Дата: 21.02.2020 Брой: 2/2020



A január utolsó hetében tapasztalt magas hőmérsékletek megzavarták az őszi vetésű növények mély alvási állapotát az ország szántóföldi régióinak nagy részén.

Február első tíz napjában az agrometeorológiai feltételeket az éghajlati normák feletti hőmérsékletek fogják meghatározni. A hónap elején ismét évszaknak megfelelően meleg időjárás várható, a napi átlaghőmérsékletek jelentősen meghaladják a téli gabonanövények vegetációs folyamatainak újraindításához szükséges biológiai minimumot. A várhatóan szokatlanul magas, akár 17-22°C-os hőmérsékletek mellett nagy a valószínűsége annak, hogy a korai virágzású gyümölcsfajoknál (mandula, kajszibarack, őszibarack, cseresznye) megzavaródik a kényszerű alvási állapot.

Az első tíz nap végén az agrometeorológiai feltételek változni fognak. A várható jelentős hőmérséklet-csökkenés akadályozni fogja az őszi vetésű növények vegetációját és a gyümölcsfák idő előtti, nemkívánatos fejlődését.

A második és harmadik tíz nap napjainak nagy részén az előrejelzett, az időszaki normákhoz közeli hőmérsékletek visszafogják a telelő mezőgazdasági növények fejlődését az ország nagyobb részén. Kivételek lehetségesek a téli gabonanövények esetében a déli és délkeleti régiók szélsőséges területein a hónap utolsó hetében.

Februárban az előrejelzett minimum hőmérsékletek, akár mínusz 10°C-ig, meghaladják a téli gabonanövények kritikus szintjeit a harmadik levél- és bokrosodási növekedési szakaszban. Ezek az értékek, hóborítás nélküli körülmények között és hosszabb ideig fennmaradva, csak a legkevésbé fejlett, kezdeti levélképződési szakaszban (1-2 levél) telelő állományok számára jelentenek kockázatot.

A hónap során várható, a normát megközelítő vagy alatta lévő csapadék javítani fogja a talaj nedvességtartalmát főként az 50 cm-es talajrétegben. Ez a csapadék hozzájárul a téli gabonanövények felső talajrétegeiben tapasztalható nedvességhiány leküzdéséhez, ami az ország keleti régióinak egyes területein (Provadia, Devnya, Shabla, Karnobat) a búzaállományok egy részének elsárgulásához vezetett. A mélyebb talajrétegekben a talaj nedvességtartaléka évszaknak megfelelően továbbra is kielégítően marad. Februárban, klímaanomáliák nélküli években, a 100 cm-es réteg talajnedvesség-tartaléka általában a mezői vízkapacitáshoz közeli szinteket ért el.

A hónap folyamán kedvezőbb feltételek az évszakos agrotechnikai tevékenységek végrehajtásához – szőlőskertekben és gyümölcsösökben a metszés, gyümölcscsülvényekben a téli növényvédő permetezés, őszi vetésű növények nitrogén tartalmú ásványi trágyákkal történő utántrágyázása, a korai tavaszi növények (borsó, búkköny, zab, tavaszi árpa) vetésére szánt területek elővető talajművelése – az első és harmadik tíz nap napjain jelentkeznek majd.

A hónap folyamán ellenőrizni kell a búzaállományokat a mezei pocok (GKS – 1 aktív kolónia/nap) egyedsűrűségére, valamint a sikeresen áttelelt közönséges búzalevéldarázs lárvák (GKS – 5 lárva/m²) károsító tevékenységére. Amikor a kártevők sűrűsége meghaladja a gazdasági kárküszöböt (GKS), az első lehetőség alkalmával, amikor a feltételek lehetővé teszik, vegyi védekezést kell végezni.

Forrás: OMSZ