

Dinamikus időjárás gyakori csapadékkal márciusban

Автор(и): Растителна защита
Дата: 02.03.2020 Брой: 3/2020



A február második felében tapasztalt átlagfeletti szezonális hőmérsékletek újraindították a telet mezőgazdasági növények nagy részének vegetációját.

Március első szakaszában az agrometeorológiai viszonyokat ismét átlagfeletti hőmérsékletek fogják meghatározni. A hónap elején előrejelzett meleg idő, akár 18-19°C-os maximum hőmérsékletekkel, aktiválja a vegetatív folyamatokat az őszi vetésű növényekben és a gyümölcsfákban az ország alföldi területein. A szakasz alatt várt csapadék javítani fogja az ötven centiméteres talajréteg nedvességtartalmát és a téli gabonanövények és a téli repce fejlődési feltételeit. Ebben az időszakban a búzaállományok jelentős része, amely a harmadik levél stádiumban telet, a szárbokrosodás stádiumába lép. A repcében a rozettás stádium lesz túlnyomó.

A második szakaszban az előrejelzett, a klimatikus normák körüli és azoktól enyhén elmaradó hőmérsékletek korlátozni fogják a mezőgazdasági növények fejlődését. Észak-Bulgária és a nyugati régiók egyes helyein, ahol a hó formájában történő csapadék sem kizárt, az őszi vetésű növények vegetációjának gyengülését és rövid távú leállását fogják megfigyelni. Az ország többi régiójában a napi középhőmérséklet értékei közel lesznek a téli gabonanövények és a téli repce fejlődéséhez szükséges biológiai minimumhoz.

Március harmadik szakaszában a hőmérsékleti viszonyok javulását és az őszi vetésű növények vegetatív folyamatainak aktiválódását várják. A hónap végén a búzában a szárbokrosodás stádium lesz túlnyomó. Az optimális agrotechnikai időszakon belül vetett téli gabonanövényekben a szárbokrosodási tényező növekedése figyelhető meg.

Márciusban a gyümölcstermő növényekben a következő fenológiai stádiumok zajlanak le: a gyümölcsrügyek megduzzadása és rügyfakadása, valamint a szakasz végén, a csonthéjas fajoknál (mandula, kajszi, őszibarack) az alföldi régiókban, a rügyképződés és virágzás megfigyelhető. A hónap során előrejelzett, akár mínusz 8°C-ig terjedő minimum hőmérsékletek kockázatot jelentenek azokra a gyümölcstermő növényekre, amelyek fejlettek a fejlődésükben és beléptek a rügyképződés és virágzás stádiumaiba.

A februárban lehullott csapadék, a hosszú téli aszály után, hozzájárult a téli gabonanövények felső talajrétegeiben tapasztalható nedvességhiány leküzdéséhez. A márciusban várt, a normát körülvevő és azt meghaladó csapadék növelni fogja a talaj nedvességtartalékát az egy méteres talajrétegben.

Márciusban a napok nagy részén az előrejelzett, gyakori csapadékkal járó dinamikus időjárás megnehezíti néhány szezonális agrotechnikai tevékenység végrehajtását. Kedvezőbb feltételek a virágzás előtti növényvédő permetezések végrehajtásához a gyümölcsösökben, valamint a korai és középkorai tavaszi növények számára kijelölt területek vetés előtti talajműveléséhez, a hónap elején és a harmadik szakasz napjain a többségén állnak elő. Március közepén kezdődik a napraforgó vetés agrotechnikai időablaka (15-20.03) Dél-Bulgáriában, és a harmadik szakasz közepén (25.03–5.04) – a Duna-síkságon.

Forrás: NIMH