

Nehéz növényvédelmi tevékenységek március közepén

Автор(и): Растителна защита
Дата: 19.03.2020 Брой: 3/2020



Március elején Nyugat- és Közép-Bulgária felett 20 – 40 l/m² közötti csapadék hullott, ami a mezőgazdasági növények 50 cm-es és 100 cm-es talajrétegében a talajnedvesség-tartalékok növekedéséhez vezetett.

Március közepén az agrometeorológiai feltételeket a telelő mezőgazdasági növények biológiai minimuma körüli és feletti napi átlaghőmérsékletek fogják meghatározni. Vegetációs folyamataik normál ütemben fognak zajlani. Az időszak első felében előrejelzett csapadék, amely ismét jelentősebb mennyiségben várható Délnyugat- és Közép-Bulgáriában, kedvezni fog a méterenkénti talajréteg nedvességtartalékának növekedésének.

Az időszakban a búza a tömeges szárhasítás stádiumában lesz, és a szárhasítási együtttható növekedése figyelhető meg. A repcénél az ágazás következik be. A gyümölcsfajoknál a rügyduzzadás és a rügypattanás megy végbe, és néhány csonthéjas gyümölcsnél (őszibarack, kajszi) Közép- és Kelet-Bulgáriában a virágzási stádium is bekövetkezik. Az időszakban megkezdődik a napraforgó vetésének agrotechnikai időkerete Dél-Bulgáriában.

A szántóföldi területek számos pontján előrejelzett csapadék hátráltatni fogja a minőségi talajművelés elvégzését és a növényvédelmi tevékenységek végrehajtását.

Forrás: NIMH