

'Hűvösödés és hirtelen változás az agrár-meteorológiai viszonyokban március végén'

Автор(и): Растителна защита
Дата: 25.03.2020 Брой: 3/2020



A március második évtizedének végén és a harmadik évtizedének elején tapasztalható átlag feletti hőmérsékletek után a (március 20–26.) időszakban hidegfront és a agrometeorológiai viszonyok hirtelen változása várható. Az időszak végére a napi átlaghőmérsékletek előrejelzett értékei jelentősen a harmadik évtizedi normál alatt lesznek, és a vetésterületek nagy részében az őszi vetésű növények vegetációjához szükséges biológiai minimum alatt is. A várható lehűlés a téli gabonanövények és a repce növekedési folyamatainak lassulásához, Nyugat-Bulgária azon részein pedig, ahol hóesésre számítanak, ezek rövid időre történő leállásához vezet. A tavasz elején a búza túlnyomórészt a szárhajtás stádiumában lesz, a repce pedig az ágazódás kialakulásának kezdetén.

Az időszak második felében ismert negatív minimumhőmérsékletekre számítanak, ami kockázatot jelent a virágzási stádiumba lépett egyes gyümölcstermő növények – mandula, kajszi, őszibarack – károsodására. A március második évtizedének végén az ország keleti és délkeleti régióinak egyes helyein már rögzítettek fagyok okozta károsodást néhány korai virágzású gyümölcsfajtán (kajszi, mandula).

Az időszak elején kedvező feltételek lesznek a szezonális agrotechnikai tevékenységek végrehajtásához. A következő időszak egybeesik a napraforgó vetés optimális agrotechnikai időkeretével Dél-Bulgáriában.

Az időszak második felében, a fejlett fejlődési stádiumban lévő gyümölcsfák károsodásának kockázatának csökkentése érdekében alkalmazható a füstölés – az egyik legelterjedtebb védekezési módszer, amely 1–3°C-os hőmérsékleti hatást ér el. Ahol lehetséges, célszerű megelőző permetezést végezni a fagy és fagykár ellen bejegyzett termékekkel.

Forrás: NIMH