

'Április elején jelentős hőmérséklet-emelkedés'

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.04.2020 Брой: 4/2020



A március végén és április elején bekövetkezett szokatlan téli időjárási események után, amelyek további károkat okoztak a fejlődésben előrehaladott gyümölcsstermesztésben, a következő hétnapos időszakban jelentős változáson megy keresztül az agrometeorológiai helyzet.

Az időszak első napjaira hőmérséklet-emelkedés várható. A síkvidéki területeken az átlagos napi értékek elérik és meghaladják a téli gabonafélék és a repce vegetációjához szükséges biológiai minimumot.

Az időszak végére a hőmérsékleti viszonyok normalizálódása és a vegetatív folyamatok aktivizálódása várható az őszi vetésű állományokban és a bevetett tavaszi növényekben. Április első dekádjának végén a búzában és az árpadban a következő fejlődési fázisok figyelhetők meg: szárhasítás, áttérés a szárhosszabbodásba és

szárhosszabbodási fázis, főként a Duna-menti síkság és az ország keleti régióinak egyes részein található állományokban (agrometeorológiai állomások: Novacsene, Szilisztra, Carev Brod, Razgrad, D. Csiflik, Karnobat). A téli repcében a rügyképződés kezdetének megfigyelése várható.

Április első dekádjának végéig a síkvidéki régiók számos helyén a tavasz eleji jelentős csapadékok következtében a felső talajrétegek magas nedvességtartalma megnehezíti az elővető talajművelést és a közepesen korai tavaszi növények vetését. Emiatt késések várhatók a napraforgó vetésében. A napraforgó vetésének agrotechnikai határideje a Duna-menti síkságon április első dekádjának közepéig, míg a dekád végéig – Északkelet-Bulgáriában, a tengerparti területeken és Délnyugat-Bulgária magasabban fekvő mezőin tart.

Kedvező feltételek alakulnak ki a tavaszi fagyok által nem károsított gyümölcsültetvények növényvédő permetezésének elvégzésére az időszak második felében.

Forrás: NIMH