

Agrometeorológiai előrejelzés április hónapra

Автор(и): Растителна защита
Дата: 20.04.2020 Брой: 4/2020



Április elején az agrometeorológiai viszonyokat változékony és hűvös időjárás fogja meghatározni. Az első évtized közepéig előrejelzett csapadék az ország számos részén vízzel telített állapotban fogja tartani a talaj felső rétegeit, ami késlelteti a napraforgó vetés előtti talajművelést és a vetést. A napraforgó vetés agrotechnikai határideje Dél-Bulgáriában március végén lejárt. Az első évtized közepéig tart a napraforgó vetés optimális időszaka a Duna-síkságon, az évtized végéig pedig Északkelet-Bulgáriában, a parti területeken és Délnyugat-Bulgária magasabban fekvő mezőin.

Az első évtized végén és a második évtized első felében hőmérséklet-emelkedésre, a hőmérsékletek normalizálódására és a vegetációs folyamatok aktiválódására számíthatunk a téli növényekben és a bevetett tavaszi növényekben. Április közepén a téli gabonanövények uralkodó növekedési stádiuma a szárhajtás lesz, a

repcénél pedig a rügyezés. A rügyezési stádiumban lévő repcénél (zöldről sárga rügyig) szükséges a monitoring végrehajtása az egyik legsúlyosabb kártevő, a repcemoly jelenléte és egyedsűrűsége tekintetében. Amikor a kártevő egyedszáma meghaladja a gazdasági kárküszöböt (EIL >5 bogár/növény), időben, a repce virágzási stádiumba lépése előtt kell védekezni.

A hónap második felében a mezőgazdasági növények fejlődése gyorsabb ütemben fog folyni, az időszakra jellemző normál körüli és feletti hőmérsékletek mellett. A repce túlnyomórészt teljes virágzásban lesz. A búzánál a szárhajtás, valamint a szárhajtásból a kalászszemzésbe való átmenet stádiumai figyelhetők meg. Április végén a legkorábban, már március második évtizedében szárhajtásba lépő növények egy részében (agrometeorológiai állomások: Szilisztra, D. Chiflik) a kalászszemzés stádiuma is megfigyelhető lesz. Ebben az időszakban a téli gabonanövényeket a napbogár, a gabonalevélbogár és a búzatripsz megjelenése és kártétele szempontjából kell monitorozni.

A harmadik évtized elején a mezőterületek 10 cm-es talajrétegében a talajhőmérséklet megfelelő értékeket fog felmutatni a gabonakukorica vetéséhez, a hónap végén pedig a hőkedvelő tavaszi növények (gyapot, földimogyoró, bab, görögdinnye és sárgadinnye stb.) vetéséhez is.

A tavasz eleji jelentős csapadék, amely sok helyen meghaladta a 30-35 l/m²-t, növelte a talaj nedvességtartalékát az egy méteres talajrétegben. Az ország nagy részén, néhány keleti és déli régióbeli helyszínt kivéve, a téli gabonanövényekben a mezővízkapacitás 90%-a feletti nedvességtartalékot mértek. Az áprilisra várható, a normál körüli és feletti csapadék biztosítani fogja a nedvességet a bevetett tavaszi növények és a fejlődésük reprodukzív stádiumába lépő őszi vetésű növények vegetációjának kezdeti szakaszának normális lefolyásához.

A hónap folyamán a várható, -2°C-ig süllyedő minimumhőmérsékletek ismét próbára teszik a fejlődésükben előrehaladott gyümölcsfákat. A tavaszi fagyok által nem érintett gyümölcsültetvényekben a növényvédő permetezések végrehajtásához kedvezőbb feltételek az első évtized második felében, a második évtized elején és a harmadik évtized közepén állnak majd elő.

Forrás: NIMH