

Hogyan érhetünk el nemcsak magasabb, hanem minőségibb termést napraforgóban és kukoricában?

Автор(и): Растителна защита

Дата: 24.04.2020 Брой: 4/2020



*A mai kihívásokkal teli időkben minden mezőgazdasági termelő azzal a feladattal néz szembe, hogyan növelheti termését és terméke minőségét, miközben megőrzi a talaj termőképességét. A válasz egyértelmű – az egyedileg formulázott **Amalgerol Essence** biostimuláns használata, amely egyidejűleg hat a talajra, a gyökérzetre és a növényekre.*

Napraforgó

A bolgár intézetekben végzett évekig tartó kísérletek, valamint az **Amalgerol Essence**-ben bizalmat helyező mezőgazdasági termelők tapasztalatai alapján a napraforgóban a következő eredményeket figyeljük meg:

- A **olajtartalom** szintje szabványos technológiával 42–45%.
- A szabványos technológia mellett az **Amalgerol Essence** használatával az olajtartalom 46–48%-ra nő.

Az elért eredmények értéke a hibridbe ágyazott potenciáltól is függ.

Egyre gyakrabban vagyunk tanúi annak a trendnek, hogy a napraforgó-kereskedők prémiumot fizetnek a magas olajtartalomért, és a magasabb olajtartalmú termelést magasabb áron vásárolják meg. Ezt a tényt először az exportáló cégeknél figyeltük meg, ma már a bolgár olajmalmok is követik a példájukat.

Vannak speciális hibridjek a piacon – **magas olajsavtartalmú napraforgó hibridjek**, amelyeknél az olajsavtartalom minimum 80%-os. A gyakorlat azt mutatja, hogy a szabványos technológiával, az **Amalgerol Essence** kombinációjában kezelt magas olajsavtartalmú hibridjek olajsavtartalma 88–90%, és ezeket magasabb áron vásárolják.

A napraforgó termésnövekedése az **Amalgerol Essence** használata után **10–15%**, attól függően, hogy a növényeket egyszer vagy kétszer kezelik. Alkalmazás:

- első kezelés a 2–4 levélpár növekedési stádiumban;
- második kezelés a rügyképződés kezdetén, a sorok záródása előtt (általában gyomirtó szerekkel kombinálva).

Az ajánlott adag 200 ml/da.

Kukorica

Az **Amalgerol Essence** kiváló eredményeket nyújt a **kukoricában** is, egy vagy két alkalmazásban, a termelő gazdálkodási technológiájától függően:

- Az első kezelést a gyomirtó szerekkel együtt végezzük. Tavaszi aszály esetén az **Amalgerol Essence** kezelés lehetővé teszi a kukoricának, hogy a termékben található antioxidánsoknak köszönhetően megbirkózzon a stresszel és minimális károkkal vészelve át az aszályt. Ha tavasszal aszályos időszak

következik be, és a kukoricát nem kezelték **Amalgerol Essence**-sel, akkor azonnali kezelést javasolunk a levelek összetekeredése előtt.

- Célszerű a második **Amalgerol Essence** kezelést június végén, a 16. levél stádiumban (virágzás) végezni, folyékony nitrogéntartalmú termék (alacsony biuret tartalommal) levéltrágyázása során.

A második kezelés révén a kukorica hatékonyabban tolerálja a júliusban és augusztusban hagyományosan várható aszályokat, és a termés **15–20%**-kal magasabb (esetenként még ennél is több). Az alkalmazási mennyiség 200 ml/da.

Javasoljuk az első kezelés elvégzését az **Amalgerol Essence** készítménnyel napraforgón és kukoricán is, mivel ez hatással van az erősebb gyökérzet és a jobban fejlett levélzet kialakulására.

Videó: <https://www.youtube.com/watch?v=3ivXtDzW5S4>

További információkért látogasson el ide: https://www.mediplusr.com/amalgerol_essence/