

A nyest komoly károkat okozhat a cseresznyefélék gyümölcsseiben.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 04.05.2020 Брой: 5/2020



A rózsabogár – *Cetonia aurata* L. országszerte elterjedt. Gyümölcsfákat károsít, kedveli a cseresznyét és a körtét. Megtalálható szőlőben, rózsán és vadrózsán is. Emellett kártételét kukorica és káposzta esetén is megfigyelték. Leggyakrabban a vadrózsa és a rózsza virágzatán fordul elő. A kamilla, a koriander és az egérfarkfű virágrészeit is fogyasztja.

Az elmúlt években a rózsabogár megfigyelhető volt a Kjusztendili régió egyes cseresznyeültetvényein és házi kertjeiben. Népsűrűsége magasabb a gyomos területeken, benőtt vadrózsabokrokon és cseresznyes kertekben. Egyes fákön akár 80 – 100 bogarat is regisztráltak.

Az imágó viszonylag nagy bogár. Testhossza elérheti a 2 cm-t. A előtor és a szárnyfedők intenzív zöld színűek, aranymetálos fénnel. A hasoldal rézvörös színű. Fehér keresztcsíkok találhatók a szárnyfedőkön.

A rózsabogár évente egy nemzedéket fejleszt. A bogarak a talajban telelnek át. Tavasszal, a gyümölcsfák virágzása idején jelennek meg. A bogarak aktívak, és délben, amikor a legmelegebb van, repülnek. Rágják a virágok porzóit és bibéjét, és károsítják a leveleket és terméseket.

A fertőzött cseresznyeterméseken mély sebeket rágnek, és legtöbb esetben teljesen elpusztítják azokat. Egyetlen fán 80%-os terméskárosodást regisztráltunk.

Kártétel

A megtermékenyített nőstények petéiket korhadt fába és korhadt faanyagban gazdag talajba rakják. A lárvák ebben a korhadó környezetben fejlődnek, és ugyanabban az évben bebábozódnak.

A rózsabogár elleni vegyi védekezést a fő kártételt okozó imágó stadium ellen kell irányítani. A rovarirtó szereket eddig nem tesztelték e kártevő ellen, mert nem fordult elő gyakran. A védekezést az is bonyolítja, hogy a permetezést a termésérés idején kell elvégezni, és be kell tartani a várható időket.

Védekezés

A rózsabogár a ganajtúrófélék családjába tartozik, amelyhez a szőrösbogár is tartozik. Javasolt rövid várható idővel rendelkező, a szőrösbogár ellen jóváhagyott rovarirtó szerek használata: Vaztak Nov 100 EC – 10 ml/da. Használhatók vonzóanyaggal ellátott világoskék vagy fehér csapdák is. A rózsabogár okozta károk csökkentéséhez szükséges a jó agrotechnikai gyakorlat is – rendszeres talajművelés, trágyázás, a gyomvegetáció, a vadrózsabokrok és a korhadt növényi maradványok összegyűjtése, eltávolítása és megsemmisítése, ahol a kártevő lárvái fejlődnek.