

Csapadék és megnövekedett jégverésveszély május elején

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.05.2020 Брой: 5/2020



A következő hétnapos időszakban az agrometeorológiai feltételeket instabil időjárás és a május első tíz napjára jellemző klímanormákhoz közeli napi átlaghőmérsékletek fogják meghatározni. Az időszak alatt elterjedt csapadék várható, valamint javulnak a feltételek az őszi vetésű és a bevetett tavaszi növények vegetációjához. Az északkeleti régiókban kialakult intenzív tavaszi aszály után a várható csapadék lehetőséget nyújt a kritikus állapotban lévő téli gabonanövények egy részének felépülésére. A talaj nedvességhiánya Északkelet-Bulgária számos területén korlátozó tényező volt a búza fejlődésében és az állományok egy részének elsárgulását okozta.

A délnyugati régiókban és a Trákiiai-alföld nagy részén, ahol áprilisban gazdasági jelentőségű csapadék hullott – egyes helyeken több mint 50-60 l/m² (Kyustendil-67 l/m², Blagoevgrad-52 l/m², Sandanski-73 l/m², Pazardzhik-83 l/m², Plovdiv-87 l/m², Haskovo-93 l/m², Stara Zagora-50 l/m², Chirpan-67 l/m²), a téli gabonanövények állapota jó.

A következő időszakban a szántóföldi területeken a búza és az árpa a szárhosszabbodásból a kalászosodás és a virágzás szakaszába lép át. A kukorica és a napraforó esetében a vetési időpontoktól függően a kelés és a levélképződés szakaszai figyelhetők meg.

Május első hetében nem várhatók a mezőgazdasági növényekre kritikus minimumhőmérsékletek, de a jégverés valószínűsége továbbra is magas. Jégkár esetén ajánlott az érintett növényeket első adandó alkalommal réztartalmú fungicidekkel kezelni a másodlagos fertőzések kockázatának csökkentése érdekében.

Forrás: NIMH