

Agrometeorológiai előrejelzés június hónapra

Автор(и): Растителна защита
Дата: 10.06.2020 Брой: 6/2020



A június első és második tíznapjain a legtöbb napon az agrometeorológiai feltételeket instabil időjárás fogja meghatározni. A hónap elején a mezőgazdasági növények fejlődése lassabb ütemben, az átlag alatti hőmérséklet mellett zajlik majd. Az első tíznap közepéig az ország számos részén csapadékot jeleznek, ami javítja a 50 cm-es réteg talajnedvesség-tartalékait és a tavaszi növények vegetációjának feltételeit. A májusi végén és a június elején esett és várható csapadék Kelet-Bulgária számos területén a téli növények számára már túl későn érkezett, ahol fejlődésük reprodukív fázisai egyre növekvő talajnedvesség-hiány mellett zajlottak. A keleti régiók nagy részében jelentős termés kiesést jeleznek, egyes helyeken pedig az idő előtt elsárgult, gyengén telített kalászu növényeket nem fogják betakarítani.

Az első tíznap második felében a szezonálisan szokatlanul hűvös idő után hőmérsékleti körülmények javulását várják. A tíznap folyamán a magasabban fekvő területeken a téli

gabonafélékben a szemtöltés zajlik majd. Az alföldi területeken a búza a tejérettség fázisában lesz, és a tíznap végére egyes helyeken a viaszérettség kezdetét is megfigyelhetik. *A szemtöltéstől a tejérettségig tartó interfázisban a búzának komoly kártételt okoz a gabonapoloska lárvája. Ebben az időszakban a búzaállományokat felügyelni kell a kártevő jelenléte szempontjából, és ha sűrűsége meghaladja a gazdasági károküszöböt, időbeni kezelés szükséges.*

A második tíznap elején az alföldi területeken az árpa túlnyomórészt a viaszérettség, a repce pedig az érés fázisában lesz.

Június második felében a mezőgazdasági növények fejlődése gyorsabb ütemben fog zajlani. A második tíznap végén és a harmadik elején a búza túlnyomórészt az érés fázisában lesz.

Június végére a tavaszi növények egy része be fog lépni fejlődésének reprodukív fázisaiba: a napraforgónál a virágzás kezdetét, a korai kukoricahibrideknél pedig a virágzatburok kifejlődését és a virágzat virágzását figyelhetik meg.

A júniusra előrejelzett instabil, gyakori csapadékkal járó időjárás kedvező feltételeket teremt számos gombabetegség terjedéséhez: lisztharmat a szőlőben és a zöldségnövényekben, varasodás a gyümölcsfákon stb. A hónap folyamán a jégesőveszély is megnövekedett marad. Jégeső után az első adandó alkalommal réztartalmú gombaölő szerekkel kell kezelni a károsított gyümölcs- és zöldségnövényeket.

Forrás: NIMH