

Agrometeorológiai előrejelzés júliusra

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.07.2020 Брой: 7/2020



Július első dekádjának első felében a mezőgazdasági növények fejlődése a normál feletti hőmérsékleti viszonyok között zajlik majd. A hónap elején az ország nagy részén, az északnyugati (Buzoveci agrometeorológiai állomás) és délnyugati régiók (Szanandaszki agrometeorológiai állomás) kivételével, a tavaszi növények vegetációja megfelelő talajnedvesség-tartalékok mellett fog zajlani az 50 cm-es és 100 cm-es rétegben (a mezőtároló kapacitás 75-80%-a felett) – a jelentős, a normál feletti júniusi csapadék következtében, amely helyenként meghaladta a 90-100 l/m²-t (Montana – 96 l/m², Veliko Tarnovo – 133 l/m², Ruse – 90 l/m², Szilisztra – 136 l/m², Dobrics – 105 l/m², Várna – 103 l/m², Kazanlak – 104 l/m², Haszkovo – 92 l/m², Kardzsali – 173 l/m², Sztara Zagora – 115 l/m²).

Az első dekádban a kukorica hibridek korai érésétől függően különböző fejlődési fázisok következnek be: levélképződés, virágzatképződés, a virágzat virágzása, a selymes bibe megjelenése. A napraforgónál a síkvidéki területeken a virágzási fázis lesz jellemző, míg a magasabban fekvő területek állományainál a virágzatképződés. A gabonafélékben (bab, szója) a hüvelyképződés figyelhető meg.

A második és a harmadik dekád elején a mezőgazdasági növények fejlődése mérsékelt ütemben, az időszakra jellemző normál, vagy annál kissé alacsonyabb hőmérsékletek mellett zajlik majd. Az előrejelzett gyakori csapadék ebben az időszakban kedvező hatással lesz a reprodukzív fejlődési szakaszban lévő tavaszi növényekre, amikor a vízigény élesen megnő (a kukoricánál a virágzatképződéstől a tejérettségig terjedő időszakban a napi vízfogyasztás eléri a 6-7 m³/holdat). Július harmadik dekádjának elején a korai kukoricahibridek egy része a síkvidéki területeken a tejérettségi szakaszba lép. A napraforgónál a magképződés és -töltődés zajlik majd. A hónap végén az agrotechnikai határidőn belül vetett állományokban, helyenként a Duna-menti síkságon és a déli régiókban, az érési fázis kezdetét lehet megfigyelni.

Július utolsó hetében az agrometeorológiai viszonyokat viszonylag száraz, meleg és forró időjárás fogja meghatározni, ami megfelelő öntözési rend alkalmazását teszi szükségessé a késői kukoricahibridek és a késői szántóföldi termesztésű zöldségnövények esetében. Az időjárási viszonyok ebben az időszakban korlátozzák számos gombabetegség terjedését, kivéve a lisztharmatot a zöldségnövényeken és gyümölcsfákon, valamint a szőlőn előforduló lisztharmatot (oidium).

Júliusban a gyümölcsfélék növényvédő permetezését a almamoly második nemzedéke, a levéltetvek és atkák ellen nem szabad alábecsülni. A növényvédő kezelések végrehajtására kedvezőbb feltételek az első és harmadik dekád legtöbb napján, a nap hűvösebb óráiban állnak majd elő.

Július legforróbb időszakaiban, akár 38-39°C-os maximum hőmérsékletek mellett, megnő a tűzveszély a gabonatermesztés során.

Forrás: OMSZ