

Megfelelő feltételek a téli gabonanövények betakarításának befejezéséhez és a növényvédő permetezések elvégzéséhez.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 22.07.2020 Брой: 7/2020



Július 17–23. között a mezőgazdasági növények növekedési folyamatai mérsékelt ütemben zajlanak majd a normálhoz közeli hőmérsékletek mellett. Az első napokon, főleg Nyugat-Bulgáriában és helyenként az ország középső régióiban, intenzív csapadékot, valamint az talajnedvesség és a tavaszi növények fejlődési feltételeinek ideiglenes javulását jósolják. Az elmúlt időszakban nem volt agronómiai szempontból jelentős csapadék. A tavaszi növények magas vízfogyasztása következtében a gyökérzett réteg talajnedvesség-tartalékai csökkentek.

A következő hét napban a agrotechnikai határidőn belül vetett korai kukorica-hibridekben a tejérettségi stádium figyelhető meg. A későbbi hibridekben különböző fejlődési fázisok lesznek – levélképződés, virágzás, selyemcimpák megjelenése és beporzás. A napraforgó állományokban virágzás, majd a magok képződése és tömörödése zajlik. A gyümölcsfajtáknál a termések növekedése és érésének folyamata, míg néhány korai érésű szőlőfajtánál a bogyók színeződése indul meg.

Az időszak alatt az ország mezőgazdasági területein, Nyugat-Bulgáriától eltekintve, ahol az első napokban csapadék várható, kedvező feltételek lesznek a téli gabonanövények betakarításának befejezésére, a növényvédő kezelések és a talajművelés elvégzésére. A gyümölcsültetvényekben a kezelések a gyümölcsmoly második nemzedéke, a varasodás és a késői barna rothadás ellen, a szőlőültetvényekben pedig a lisztharmat ellen irányulnak. A növényvédő kezeléseket a nap hűvösebb óráiban kell végezni.

Forrás: NIMH