

Agrometeorológiai előrejelzés július végére

Автор(и): Растителна защита
Дата: 28.07.2020 Брой: 7/2020



Július végén az agrometeorológiai feltételeket a normál körüli és feletti hőmérsékletű forró időjárás fogja meghatározni. Az időszak első felében ismét csapadék várható Nyugat- és Közép-Bulgária egyes részein, ami javítani fogja a felső talajrétegek nedvességtartalmát. Az elmúlt időszakban ezeken a területeken 20 – 40 l/m² közötti, mezőgazdaságilag jelentős csapadékot jegyeztek fel, de lokális jellegű volt. Az ország többi részén a csapadék hiánya a talajvízhiány fokozódásához vezetett.

Az időszakban a napraforgónál a virágzás és a magtöltés fenofázisai zajlanak. Néhány korábbi hibridben, amelyeket az agrotechnikai határidőn belül vetettek, az érési fázis következik be (agrometeorológiai állomások: Szlivén, Ljubimec). A kukoricánál különböző fázisok figyelhetők meg – a késői hibrideken a virágzás és a beporzás folyamatban van, a középkorai hibrideken a selymes fonalak megjelenése és barnulása figyelhető

meg, a legkorábbi kukorica hibrideknél pedig a Duna-menti síkság egyes részein (agrometeorológiai állomás: Pavlikeni) a tejérettség állapota látható. A szőlőben a bogyók színeződésének és megpuhulásának fázisa figyelhető meg.

Az időszakban a feltételek megfelelőek lesznek a szezonális agrotechnikai tevékenységek végrehajtásához, amelyek a télibúza félék betakarítását követően felszabadult területek talajműveléséhez kapcsolódnak – a talajkapillárisok megszakítására és a rendelkezésre álló talajnedvesség megőrzésére irányuló tarlóhántás, a vetés előtti szántás és előkészítés, valamint a teljes gyomirtók kezelése erős gyomfertőzöttség esetén a betakarítás utáni területeken. Az almaültetvényekben és a szőlőskertekben folytatódnak a gombaölő permetezések a lisztharmat fertőzésének és fejlődésének megelőzésére. A növényvédelmi tevékenységeket 25°C-ot meg nem haladó levegőhőmérsékleten kell végezni.

Forrás: OMIH