

Agrometeorológiai előrejelzés augusztusra

Автор(и): Растителна защита
Дата: 09.08.2020 Брой: 8/2020



A repcevetés agrotechnikai időkerete augusztus harmadik tíz napos periódusában kezdődik. Augusztusban a gyümölcsfák késői fajtáinál nem szabad alábecsülni a gyümölcsmolyok utolsó nemzedékének káros tevékenységét. A hónap napjainak nagy részében uralkodó viszonylag száraz időjárás előfeltétele lesz a atkák populációjának növekedésének. Szőlőültetvényekben szükséges megfigyelni az Európai szőlőmoly harmadik nemzedékének hernyóinak megjelenését és sűrűségét.

Augusztusban az agrometeorológiai feltételeket a hónapra jellemző klímánormákhoz közeli hőmérsékletek és csapadék határozzák meg.

Августус elején a késői tavaszi növények fejlődése az ország nagy részében mélyülő talajnedvesség-hiány mellett fog zajlani. Kivételek figyelhetők meg Északnyugat-Bulgária és a Szófiai-mező egyes helyein, ahol a júliusi csapadék meghaladta a havi normákat (Novo Selo - 84 l/m², Vraca - 128 l/m², Montana - 88 l/m², Szófia - 111 l/m², Kjustendil - 72 l/m², Dragoman - 56 l/m²) és növelte a nedvességtartalék szintjét a talaj 50 és 100 cm-es rétegében. Az ország nyugati régióiban az augusztus első tíz napos periódusának második felére előrejelzett csapadék nedvességet biztosít a későbbi kukorica hibridjek és a második növények vegetációjához.

Kelet-Bulgáriában és a déli régiókban nem várható csapadék augusztus első tíz napos periódusa alatt, és egyes helyeken a mélyülő aszály kétségessé teszi az öntözés nélkül termesztett tavaszi növények betakarítását. E régiók némelyikében a szegényes júliusi csapadék következtében – egyes helyeken 2-3 l/m² alatt (Rusze, Sabla, Sztara Zagora, Szliven, Karnobat, Burgasz, Haszkovo, Kardzsali) – a talajnedvesség-tartalékok az 50 és 100 cm-es rétegben teljesen kimerültek (agrometeorológiai állomás, Szliven).

Августус közepéig az előrejelzett magas hőmérsékletek, maximumértékei akár 36-38°C-ig, a késői szántóföldi növények fejlődésének interfázisainak lerövidüléséhez vezetnek. Az ilyen nagyságrendű értékek, alacsony légköri páratartalommal kombinálva, negatív hatással lesznek a késői szántóföldi termesztésű zöldségfélék virágzására és termékenyítésére.

Августус első tíz napos periódusa alatt a korábbi kukorica hibridjek befejezik fejlődésüket, a közepesen korai hibridjek pedig a tejérettségi stádiumba lépnek. A napraforgónál a Duna-menti síkságon és a déli régiókban az érési stádium figyelhető meg. A második tíz napos periódus végén és a harmadik elején a szántóföldi régiókban a napraforgó túlnyomórészt műszaki érettségi stádiumban lesz. A harmadik tíz napos periódus alatt a közepesen késői kukorica hibridjek a viaszérettségi stádiumba lépnek. A rizsnél a tejérettségi stádium, a szójánál az érési stádium, a gyapotnál pedig a gubó nyílás kezdete figyelhető meg.

Csapadék valószínűsége, a talaj víz-fizikai állapotának javulása a felső rétegekben, valamint a téli repcevetésre szánt területek vetés előtti talajművelésének végrehajtási feltételeinek javulása a harmadik tíz napos periódus második felére várható. A repcevetés agrotechnikai időkerete augusztus harmadik tíz napos periódusában kezdődik.

Августусban a gyümölcsfák késői fajtáinál nem szabad alábecsülni a gyümölcsmolyok utolsó nemzedékének káros tevékenységét. A hónap napjainak nagy részében uralkodó viszonylag száraz időjárás előfeltétele lesz a atkák populációjának növekedésének. Szőlőültetvényekben szükséges megfigyelni az Európai szőlőmoly harmadik nemzedékének hernyóinak megjelenését és sűrűségét. A növényvédő permetezéseket a nap

hűvösebb óráiban kell elvégezni, a termesztmények érési idejéhez igazodó, megfelelő betakarítás előtti időtartammal rendelkező termékekkel.

Forrás: NIMH