

Szeptember elején megfelelő feltételek nyílnak a tavaszi vetésű növények betakarítására, valamint a gyümölcs- és zöldségtermés begyűjtésére.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.09.2020 Брой: 9/2020



Augusztus végén az agrometeorológiai viszonyokat a normál feletti hőmérséklet és a csapadékhány jellemezte, ami negatívan befolyásolta a késői tavaszi növények fejlődésének utolsó szakaszait, és akadályozta a vetés előtti talajművelés megfelelő elvégzését.

A következő időszakban az agrometeorológiai viszonyokat a klímanormákhoz közeli hőmérsékletek határozzák majd meg. Az időszak elején helyenként, Északkelet-Bulgáriában gazdaságilag jelentős csapadék várható. Az

időszak alatt a napraforgó túlnyomórészt a technikai érettség stádiumában lesz. A késői hibrid kukoricáknál a tej- és viaszérés szakaszai következnek be. Folyamatban van a téli repce területek vetésének optimális időszaka. Sok régióban a talajszárazság akadályozni fogja az agrotechnikai tevékenységeket és a téli repce vetését. Ez későbbi vetést tesz szükségessé, a lehetséges vetési időszak a hónap végéig nyúlhat. Az almaültetvényekben figyelemmel kísérik a almamoly második generációjának károsító tevékenységét, és szükség esetén végeznek a kártevő elleni kezeléseket. A őszi vetésre szánt búza és árpa magvain fertőtlenítést végeznek a magról terjedő betegségek (közönséges bűdösszag, lőszem, szeptóriás levélfoltosság és fuzáriumos betegségek) ellen.

A feltételek kedvezőek lesznek a technikai érettséget elért tavaszi növények betakarításához, a növényvédelmi tevékenységek végrehajtásához a többéves kultúrákban, valamint a gyümölcs- és zöldségtermelés betakarításához.

Forrás: NIMH