

Agrometeorológiai előrejelzés szeptemberre

Автор(и): Растителна защита
Дата: 21.09.2020 Брой: 9/2020



Szeptemberben is jelentősen eltérőek lesznek az agrometeorológiai viszonyok Nyugat-Bulgáriában az ország keleti régióitól.

Kelet-Bulgáriában ezeket az átlagnál magasabb hőmérséklet és az átlagnál alacsonyabb csapadék fogja meghatározni. A keleti régiók számos területén a hosszú nyári szárazság következtében a tavaszi növények idő előtt befejezték a vegetációt. Ezeken a területeken a napraforgó és a korai kukoricahibridek betakarítása a szokásos időpontoknál korábban kezdődött, a hozam pedig jelentősen elmaradt az országos átlagtól.

Szeptemberben Nyugat-Bulgária legtöbb régiójában a késői mezőgazdasági növények fejlődésének utolsó szakaszai átlagnál magasabb hőmérséklet mellett, a klimatikus normákhoz közeli csapadékkal és jó nyárvégi

talajnedvesség-tartalékkal zajlanak majd az 50 és 100 cm-es rétegekben (a teljes vízkapacitás 70%-a felett – Nikolaevo, Kjustendil, Szandanszki) – ami az augusztusi átlagnál magasabb csapadékmennyiség következménye (Vidin – 67 l/m², Lom – 80 l/m², Szófia – 84 l/m², Kjustendil – 98 l/m², Blagoevgrad – 152 l/m², Szandanszki – 107 l/m²).

Szeptember első dekádjában is agronómiai szempontból jelentős csapadék várható az ország nyugati felében. Ez kedvező hatással lesz a másodszori növényekre és a késői kukoricahibridekre, amelyek a tejérettség fázisában lesznek. Ebben a dekádban a mezőkön a középkéső hibridek a viaszérettség fázisába lépnek. A hónap közepéig a késői hibridek egy része befejezi a fejlődését. A második dekádban a rizs a viasz- és teljes érettség fázisában lesz. A harmadik dekádban az érési fázis következik be a gyapotban, a földimogyoróban, az őszi gyümölcsfajtákban és a későbbi szőlőfajtákban. A hónapra előrejelzett minimális hőmérsékleti értékek a zöldségnövények kritikus küszöbértékei felett vannak, ami előfeltétele a késői mezői termesztésből származó további zöldségtermelésnek.

A második és harmadik dekád legtöbb napján viszonylag száraz időjárás várható, és a feltételek megfelelőek lesznek a tavaszi növények területeinek megtisztításához.

Szeptemberben is a keleti régiók nagy részén a felső talajrétegek nedvességhiánya akadályozni fogja a téli repce és a téli gabonanövények vetésére kijelölt területek minőségi mélyszántását és vetés előtti talajművelését. A repce optimális vetési időkerete a hónap második dekádjának végéig tart. A harmadik dekádban kezdődnek a mezőkön a magasabb fekvésű területeken az árpa és a búza agrotechnikai vetési határidejei.

Forrás: NIMH