

# Meleg és száraz ősz vár ránk októberben

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 06.10.2020 Брой: 10/2020



Az őszi időszak elején, a tartós szárazság után az agrometeorológiai viszonyok kedvező változáson mentek keresztül. A csapadék, amely az ország számos részén meghaladta a 20–30 l/m<sup>2</sup>-t (Vraca, Knezsa, Orjahovo, Szófia, Dragoman, Kjusztendil, Blagoevgrad, Szandanszki, Kazanlák, Kardzsali, Elhovo, Razgrad, Burgasz), megnövelte a talaj felső rétegeinek nedvességtartalmát, ami nagy jelentőségű a szezonális talajművelés megfelelő végrehajtása szempontjából. Kivételek a Trákiai-alföld egyes részein és a keleti régiókban vannak, ahol a szeptember végi csapadéknak nem volt gazdasági jelentősége.

Októberben az agrometeorológiai viszonyokat a klímanormák feletti hőmérsékletek és a havi normál alatti csapadék fogja meghatározni.

Az első évtizedben nem várható jelentős csapadék, és a vetésterületek nagy részén a feltételek lehetővé teszik az őszi vetés előkészítő talajművelésének és az őszi növények vetésének elvégzését. Idén a szárazság hátráltatta a téli repce vetését, és a tervezett területek nagy részét októberben fogják bevetni – az agrotechnikai

határidők után. Megnőtt annak a valószínűsége, hogy a később bevetett állományok nem képesek rozettát (7–8 levelet) kifejleszteni az őszi vegetáció végéig, amely fázisban a repce sikeresen áttelel.

Október a téli gabonanövények vetésének optimális időszaka. A hónap első felében van a búza vetésének agrotechnikai határideje Észak-Bulgáriában, a második felében – Dél-Bulgáriában, a harmadik évtizedben pedig – a Fekete-tenger menti területeken.

Az első évtizedben a előrejelzett, évszaknak megfelelően magas hőmérsékletek, maximum 25–30°C-ig, felgyorsítják a késői borászati szőlőfajták érését, és feltételeket biztosítanak a késői szántóföldi termesztésű zöltségfélék további termeléséhez.

Október második felében az évszaknak nem megfelelően meleg időjárás után a hőmérsékleti viszonyok fokozatos normalizálódása várható. A második és a harmadik évtized első felében előrejelzett csapadék nagy jelentőségű lesz a bevetett őszi növények vegetációjának kezdeti fázisainak normális lefolyása szempontjából. Október végén, a vetési időpontoktól függően, a búzában a következő fejlődési fázisok figyelhetők meg: kelés, harmadik levél és a hajtászárak kezdete a legkorábban bevetett, október elején vetett állományokban.

A hónap során előrejelzett, normál feletti hőmérsékletek feltételeket teremtenek bizonyos kártevők – a mezei pocok – egyedszámának növekedéséhez. Októberben figyelemmel kell kísérni az őszi növényeket, és amikor a pocokállomány meghaladja a gazdasági kárküszöböt (2 aktív kolónia/dekár), szükséges a védekezés engedélyezett rágcsálóirtó szerek (Phostoxin granulátum) felhasználásával – mérgezett csalétek, amelyeket a kolóniák bejáratánál helyeznek el.

A hónap legtöbb napján a feltételek alkalmasak lesznek a gyümölcsstermés betakarítására. A varasodással érintett alma- és körteültetvényekben a kórokozó mennyiség csökkentése érdekében tanácsos, a lombhullás kezdetén, a gyümölcs betakarítása után, 5%-os karbamid oldattal végezni kezelést.

A csonthéjas gyümölcsfajoknál a tömeges lombhullás után 2%-os bordói lévvvel való permetezés javasolt a lyukasfoltosság, a korai barna rothadás, az őszibarack levélhajlító gomba stb. kórokozóival szemben.

*Forrás: NIMH*