

Ellenőrizze rendszeresen a növényeket közönséges pocok jelenlétére október és november hónapokban.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 12.10.2020 Брой: 10/2020



Októberben és novemberben az őszi növényeket ellenőrizni kell, és amikor a réti pocok kártevő egyedsűrűsége meghaladja a gazdasági kárküszöböt (2 aktív kolónia holdanként), szükségesek a védekezési intézkedések.

Réti pocok (*Microtus arvalis*) – országszerte elterjedt. Kárt okoz a gabonanövényekben, lucernában, repcében, gyümölcsösökben stb. Kolóniákban él, hosszú alagutakban, amelyeknek változó számú nyílása van a felszínen. A lakott kolóniákat a szétszórt földkupacok, a jól formált bejárat és a belé helyezett zöld levelek alapján lehet azonosítani. Meleg és száraz teleken a pockok szaporodóképessége nagyon magas. Egész évben

szaporodik, és egyetlen pár utódai akár 2400 egyedet is elérhetnek. A növények zöld részeivel táplálkozik. A károsítás a növény felbukkanásától a betakarításig megfigyelhető. Súlyos fertőzés esetén az állomány ritkul. A betakarítás után mély szántást javasolt a kolóniák megsemmisítése és a pockok táplálékául szolgáló, esetlegesen felbukkanó gyomvegetáció felszámolása érdekében. A terepi ellenőrzések során meghatározzák a pockok egyedsűrűségét, és amikor holdanként 2 aktív kolónia található, mérgezett csalétket helyeznek a nyílásokba (a lakottakba), és lábbal letapossák a madarak és a hasznos vad védelme érdekében. A kezelést erre az alkalmazásra engedélyezett rágcsálóirtó szerek (Phostoxin granulátum) – a kolóniák bejáratába helyezett mérgezett csalik – segítségével végzik.