

A közepes októberi időjárási viszonyok javítása a szezonális agrotechnikai tevékenységek végrehajtásához

Автор(и): Растителна защита

Дата: 21.10.2020 Брой: 10/2020



Október közepén az agrometeorológiai viszonyokat instabil időjárás és az október második tíz napjára jellemző normálhoz közeli hőmérsékletek határozzák majd meg. Az előző időszak jelentős csapadéka sokfelé meghaladta az 40-50 l/m²-t (N. selo - 66 l/m², Lovech - 61 l/m², Pleven - 73 l/m², V. Tarnovo - 61 l/m², Svishtov - 51 l/m², Kazanlak - 73 l/m², Kardzhali - 60 l/m², Stara Zagora - 54 l/m², Chirpan - 60 l/m², Karnobat - 63 l/m²), ami a felső talajrétegek talajnedvesség-tartalékainak és a bevetett őszi növények vegetációjának kezdeti szakaszához szükséges feltételek éles javulásához vezetett. Az időszak elején további csapadék várható, valamint a talajnedvesség-tartalékok növekedése az 50 cm-es talajrétegben. Nyugat- és Közép-Bulgária

számos helyén eléri majd a teljes vízkapacitás 75%-át, sőt azt meghaladó szinteket. Pozitív változás várható a talajnedvesség szintjében az ország északkeleti régióiban is, amelyeket a tartós aszály a leginkább sújtott.

Az időszak közepén jelentős hőmérséklet-csökkenés várható, a medencékben pedig a fagyérzékeny zöldségnövényekre kritikus minimumértékek. A bevetett őszi növények fejlődése a második tíz nap végén és a harmadik tíz nap elején a normál alatti hőmérsékleti viszonyok között fog zajlani. Az október első tíz napjában bevetett búzában és árpaában a kelés szakasza lesz túlsúlyban. A korábban, szeptember végén és október elején bevetett őszi gabonanövényeknél a levélképződés (1–2 levél) figyelhető meg.

Az időszak végén javulás várható a szezonális agrotechnikai tevékenységek, melyek közül a legfontosabb a búzavetés, végrehajtásának feltételeiben. A következő hétnapos időszak egybeesik az őszi gabonanövények vetésének agrotechnikai határidejével Dél-Bulgáriában.

Október harmadik tíz napja alatt a korábban bevetett búzaállományokban figyelemmel kell kísérni egyes kártevők egyedsűrűségét: mezei pocok, búzalevélbogár, gabonalegyek stb., amelyek komoly károkat okoznak az őszi gabonanövényeknek vegetációjuk kezdeti szakaszában.

Forrás: NIMH