

# Csapadék és a megfelelő körülmények gyümölcsfák ültetéséhez novemberben

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 11.11.2020 Брой: 11/2020



A hosszú aszály után az októberi, a normál feletti csapadék, amely Észak-Bulgária egyes helyein meghaladta a 70-80 l/m<sup>2</sup>-t (N. selo - 72 l/m<sup>2</sup>, Montana - 71 l/m<sup>2</sup>, Knezha - 80 l/m<sup>2</sup>, Pleven - 94 l/m<sup>2</sup>, Lovech - 79 l/m<sup>2</sup>, Dobrich - 75 l/m<sup>2</sup>), jelentős nedvességtartalék-növekedéshez vezetett a talaj felső rétegeiben és javította a bevetett őszi növények vegetációjának kezdeti szakaszaihoz szükséges feltételeket. Október végén az agrometeorológiai állomásokon (Szilisztra, Knezha, Szófia, Kjustendil, Novacsene, Nikolaevo, Pavlikeni, Borima, Kazanlak, Pazardzjik, Plovdiv) a 50 cm-es rétegben a téli gabonanövények esetében a mezővízkapacitás 75-80%-át érték el, illetve meghaladták azt.

Novemberben a tervezett, a havi normát elérő vagy azt meghaladó csapadék növelni fogja az őszi nedvességtartalékokat a talaj 50 és 100 cm-es rétegében.

November első felében a téli gabonanövények és a téli repce fejlődése mérsékelt ütemben fog folyni, a klímai normákhoz közeli hőmérsékletek mellett. Ebben az időszakban a búzában, a vetés időpontjától függően különböző fejlődési fázisok figyelhetők meg – csírázás, harmadik levél és elágazás a szeptember végén és október elején bevetett korai növényeknél.

A második évtized végére lehűlést és az agrometeorológiai viszonyok jelentős változását jósolják. A magasabban fekvő területeken, ahol a hó formájában történő csapadék sem kizárt, az őszi növények vegetatív folyamatainak leállása várható.

November harmadik évtizede alatt a növények fejlődése a legtöbb mezőgazdasági régióban lassult ütemben fog folyni, a téli gabonanövények vegetációjához szükséges biológiai minimumhoz közeli hőmérsékletek mellett. A búza, az árpa és a téli repce aktívabb vegetatív folyamataihoz kedvezőbb feltételek az ország déli és délkeleti régióiban alakulnak ki. November végén a harmadik levél fázisában lévő búza- és árpaültetvények lesznek túlnyomóak.

Idén az aszály megnehezítette a téli repce időben történő vetését. Emiatt november végéig csak a növények egy része, főként az ősz elején bevetettek, mutatja majd a rozetta képződésének kezdeti fázisát (5-6 levél).

Novemberben a tervezett,  $-7^{\circ}\text{C}$ -ig terjedő minimumhőmérsékletek meghaladják az őszi növények, amelyek fejlődésük kezdeti szakaszában vannak, kritikus szintjeit.

A gyümölcsfák ültetéséhez kedvezőbb feltételek a hónap első felében alakulnak ki.

*Forrás: NIMH*