

Agrometeorológiai előrejelzés november végére és december elejére

Автор(и): Растителна защита
Дата: 30.11.2020 Брой: 11/2020



November végén az ország hóborította földként ébredt. Múlt éjjel az idény első havazása érte Nyugat-Bulgáriát. A hőmérséklet nulla fok alá süllyedt, aminek következtében a csapadék Szófiában, Razgradban, Pernikben és Küstendilben hóvá alakult. A hóborítás várhatóan akár 5 cm-es is lehet, kivéve a Duna-menti síkságon, ahol a vastagság 10–15, egyes helyeken akár 20 cm között mozog.

November végén és december elején az agrometeorológiai viszonyok egyre dinamikusabbá válnak. Az időszak elején az időjárás enyhe lesz az évszakhoz képest, a napi átlaghőmérséklet a legtöbb szántóföldi területen körülbelül vagy éppen a téli gabonafélék és a téli repce növekedéséhez szükséges biológiai minimum felett lesz.

Ezen időszak alatt jelentős hőmérsékletcsökkenés és az agrometeorológiai viszonyok változása várható. A várt lehűlés a növekedési folyamatok lassulásához, a magasabban fekvő területeken és az Elő-Balkánon, ahol havazás is várható, pedig az őszi vetésű növények vegetációs folyamatainak teljes leállásához vezet. Kivételt képeznek a délkeleti régiók és a Fekete-tenger menti területek egyes részei, ahol a téli gabonafélék gyengébb növekedése figyelhető meg.

December elején az agrotechnikai időszakon belül, októberben vetett búzaállományoknál a szárhajtásosodás szakasza figyelhető meg, amelyben a téli gabonafélék sikeresen áttelelnek. A november elején vetett állományokban a harmadik levél szakasz lesz jellemző. A későn, november közepén vetett állományok nem megfelelően fejlődtek, és a kelés, illetve a kezdeti levélképződés szakaszában vannak. A repcében a rozettás szakasz, az áttelelésre kedvező fázis, az őszi elején vetett állományokban figyelhető meg.

A következő időszakban csapadék és a talaj felső rétegeiben lévő nedvességtartalék javulása várható. A novemberi átlag alatti csapadék miatt a búzaföldek 50 és 100 cm-es talajrétegeiben lévő nedvességtartalék az ország nagy részében rendkívül alacsony az évszakhoz képest – a keleti és a legdélebbi régiók egyes területein a teljes víztartó képesség 60%-a alatt van (agrometeorológiai állomások: Szandanszki, Haszkovo, Szlivén, Razgrad).

A következő időszak elején a feltételek kedvezőek lesznek gyümölcsfák ültetéséhez, valamint a gyümölcsösökben végzett őszi növényvédő permetezésekhez.

A gyümölcsfák téli hideg elleni védelme, a zuzmók és a mohák elpusztítása, valamint a barna márványos poloska és a leopárdfrász elűzése érdekében szükséges a fák törzsét és vastagabb ágait 20%-os mészvízzel kezelni, amelyhez kis mennyiségű agyagot kell keverni.

Forrás: NIMH