

Agrometeorológiai előrejelzés az év elején

Автор(и): Растителна защита
Дата: 04.01.2021 Брой: 1/2021



A decemberi átlag feletti hőmérsékletek, melyek maximum értékei a síkvidéki területek számos pontján (Knezsa, Pleven, Lovecs, Veliko Tarnovo, Ruszé, Szilisztra, Pazardzsik, Plovdiv, Sztara Zagora, Chirpan, Elhovo, Várna, Burgasz) elérték a 17-18°C-ot, meghosszabbították az őszi vetésű növények vegetációs folyamatait. Az évszaknak nem megfelelően magas hőmérsékletek egyes korai virágzású gyümölcsfajoknál (őszibarack, cseresznye) korai rügyduzzadást váltottak ki, ami a fagyállóságuk csökkenéséhez vezet.

Január első tíz napos időszakában az agrometeorológiai feltételeket az átlag feletti hőmérsékletek fogják meghatározni. A hónap elején a síkvidéki területek számos pontján a napi középértékeik ismét meghaladják a téli gabonanövények vegetációjához szükséges biológiai minimumot.

Az őszi vetésű növények vegetációs folyamatainak lehülésére és leállítására az első tíz napos időszak második felében számíthatunk.

A második és harmadik tíz napos időszakokban az előrejelzett, a klimatikus normákhoz közeli hőmérsékletek a téli gabonaféléket és a repcét pihenő állapotban fogják tartani. A várt elterjedt hóesés javítani fogja az őszi vetésű növények áttelelési feltételeit. A búza különböző fenológiai stádiumokban vonult a télbe, ami az elhúzódó őszi szárazság és a késleltetett vetés következménye. A késői vetésű téli gabonafélék, melyeket az őszt végén vetettek, nem megfelelően álltak be, és az ország déli régióinak egyes pontjain (agrometeorológiai állomások – Plovdiv, Haszkovo, Ljubimec, Szliven, Jambol) a kelés és a korai levélképzés stádiumaiban vannak. A búzaállomány jelentős része háromleveles stádiumban fog áttelelni. A megfelelő áttelelési stádiumnak számító szárhasítási stádiumban azok a téli gabonafélék vannak, amelyeket az optimális agrotechnikai időszakban vetettek (agrometeorológiai állomások – Bazovec, Novacsene, Pavlikeni, Targoviste, Szandanszki, Pazardzsik, Karnobat, Dolni Csiflik).

Januárban az előrejelzett, mínusz 15°C-ig érő minimumhőmérsékletek hó nélküli körülmények között és hosszabb ideig tartó fennállásuk esetén kritikusak lesznek a szárhasítás nélküli téli gabonafélék, valamint azok számára, amelyek őszi vegetációjuk során nem képeztek rozettát.

A januári, a normát megközelítő vagy azt meghaladó várható csapadék növelni fogja a talaj 100 cm-es rétegében található nedvességtartalékokat. A decemberi átlag feletti csapadék (Kardzsali – 194 l/m², Haszkovo – 142 l/m², Szliven – 125 l/m², Sztara Zagora – 123 l/m², Szilisztra – 109 l/m²) jelentősen megnövelte a felső talajrétegek nedvességtartalékát. A tél elején a búzatáblákon a talaj 50 cm-es rétegében a nedvességtartalék a síkvidéki területek nagy részén elérte a teljes vízkapacitás (TÖK) 85-90%-át meghaladó szintet.

Januárban a szőlők és gyümölcsösök téli metszésének végrehajtására kedvezőbb feltételek a harmadik tíz napos időszakban alakulnak ki.

Forrás: OMSZ