

Agrometeorológiai előrejelzés februárra

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.02.2021 Брой: 2/2021



Február első tíz napjában az agrometeorológiai viszonyokat a normál feletti hőmérsékletek határozzák meg, és a síkvidéki területek sok helyén átlagos napi értékeik elérik a téli gabonanövények vegetatív folyamatainak újraindításához szükséges biológiai minimumot.

Az első tíz nap végén és a második tíz nap elején hőmérséklet-csökkenés várható, amely megakadályozza a korai vegetációt az őszi vetésű növényeknél és néhány korai virágzású csonthéjas gyümölcsfajtánál az ország síkvidéki régióiban. A második tíz napban a előrejelzett átlagos napi hőmérsékletek a klimatikus normák közelében lesznek, és a teletől mezőgazdasági növényeket nyugalmi állapotban tartják.

A harmadik tíz napban az agrometeorológiai viszonyokat ismét a normál feletti hőmérsékletek határozzák meg, amelyek megzavarják az őszi vetésű növények relatív nyugalmát és néhány korai virágzású gyümölcstermő növény kényszerű nyugalmát. Február végén Dél-Bulgária és a Fekete-tenger partvidéke egyes területein a téli gabonanövényeknél késleltetett vegetációra alkalmas feltételek alakulnak ki, de a növények fenológiai állapotának jelentős változása nem várható. A búzánál a harmadik levél és a szárzás növekedési stádiumai figyelhetők meg. Az ország legdélebbi és délkeleti régióiban, néhány korai virágzású csonthéjas gyümölcsfajnál (mandula, őszibarack, cseresznye) a rügyek megduzzadnak, és egyes helyeken megkezdődik a rügyfakadás.

Februárban a minimumhőmérsékletek előrejelzett értékei, akár mínusz 12-13°C-ig, hóborítás nélküli és hosszabb ideig tartó körülmények között kockázatot jelentenek a későn vetett, a 2-3 levél stádiumában vegetációt befejező téli gabonanövények, valamint az őszi vegetáció során nem tudott rozettát kialakítani repcetermesztés számára.

A hónap során várható, a norma körüli és feletti csapadék növelni fogja a nedvességtartalékot a talaj kétméteres rétegében. A január normál feletti csapadéka következtében, amely az ország sok helyén meghaladta a 140-150 l/m²-t (Vraca -146 l/m², Sumen -147 l/m², Várna -154 l/m², Dragoman -158 l/m², Blagoevgrad -145 l/m², Szandanszki -151 l/m², Haszkovo -146 l/m², Kardzsali -176 l/m², Elhovo -163 l/m², Burgasz -185 l/m²), a talaj nedvességtartaléka a téli gabonanövények egy méteres rétegében a mezővízkapacitás (FC) közelébe érte el a szintet.

Február első és második tíz napjaiban a talaj felső rétegeinek magas nedvességtartalma korlátozni fogja néhány agrotechnikai tevékenység végrehajtásának lehetőségét – az őszi vetésű növények nitrogén tartalmú ásványi műtrágyákkal történő utántrágyázását, a korai tavaszi növények (borsó, bükköny, zab, tavaszi árpa) vetésére szánt területek elővető talajművelését. A szőlőskertekben és gyümölcsösökben történő metszésre, valamint a gyümölcsösökben történő téli növényvédő permetezésre alkalmasabb feltételek február első és harmadik tíz napjainak legtöbb napján állnak majd rendelkezésre.

Forrás: OMSZ