

Közönséges körtebolha - *Psylla pyri*

Автор(и): Растителна защита
Дата: 23.02.2021 Брой: 2/2021



Kártétel:

A kifejlett egyedek, lárvák és nimfák a körte rügyeiből, leveleiből, virágaiból, terméseiből és hajtásaiból szívogatják a nedveket, ezzel kárt okozva;

A táplálkozás során a levéltetvek "mézharmatot" választanak ki, amely beszennyezi a fertőzött részeket, mivel azon később korompenész gombák fejlődnek ki;

A hajtások, vesszők és levelek korai öregedését okozza, mivel megnöveli azok nitrogéntartalmát;

Leg súlyosabb negatív hatása a fára a mikoplazmák átviteléből adódik, amely elzárja az vezető edényeket;

Tömeges szaporodás esetén a körtefák gyengülését és elhalását okozza;

Téli áttelelésre kifejlett egyedként a lehullott levelek alatt, repedésekben, a törzs öreg, repedezett kéreg alatt és más alkalmas helyeken készül.

Védekezés:

A védekezés fő időszakai ősszel, a téli áttelelő állomány csökkentésére, mielőtt az tömegesen vonulna az áttelelő helyekre, és kora tavasszal vannak;

A tavaszi kezelést február vagy március első melegebb napjain, a lehető legkorábban kell elvégezni, amikor a hőmérséklet három vagy több napon át 5-8°C felett marad;

Az ekkori védekezés ismét a kifejlett egyedek ellen irányul, amikor azok elhagyják áttelelő helyeiket és a körte rövid, tasakos hajtásaira vonulnak;

Gazdasági kárküszöb - 1 kifejlett egyed és 8-10 pete 8-10 tasakos hajtáson;

Permetezés bejegyzett rovarirtó szerekkel.

A fák alapos lemosása a permetoldattal (150-180 l/da).